




الدالة اللوغاريتم النيبيري

الكفاءات المستهدفة



الكفاءات المستهدفة من خلال هذا المحور هي :

تعريف الدالة اللوغاريتم النيبيري

خواص الدالة اللوغاريتم النيبيري

حل معادلات و متراجحات

دراسة الدالة $\ln(u(x))$

تعريف دالة اللوغاريتم العشري

حل معادلات التفاضلية من الشكل $y' = ay + b$

2 الحالة اللوغاريتمية النيبيرية

اللوغاريتم النيبيري لعدد :

مبرهنة و تعريف 1

أضف إلى

معلوماتك

من أجل كل عدد حقيقي a من $]0, +\infty[$ يوجد عدد حقيقي وحيد b بحيث : $e^b = a$ يسمى هذا العدد اللوغاريتم النيبيري للعدد a ونرمز له بالرمز " $\ln a$ "

مثال

العدد الحقيقي الوحيد b الذي يحقق $e^b = 2$ هو $\ln 2$

تعريف الدالة $\ln$:

تعريف

نسمي "الدالة اللوغاريتمية النيبيرية" الدالة التي نرمز لها بالرمز $\ln$ والتي ترفق بكل عدد حقيقي x من $]0, +\infty[$ العدد الحقيقي $\ln(x)$

نتائج

1 من أجل كل x من $]0, +\infty[$ ومن أجل كل y من $\mathbb{R}$ ، $x = e^y$ معناه $y = \ln x$


2 من أجل كل x من $]0, +\infty[$ ، $e^{\ln x} = x$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $\ln(e^x) = x$

3 بما أن $e^0 = 1$ فإن $\ln 1 = 0$ ، وبما أن $e^1 = e$ فإن $\ln e = 1$

ملحظة: نعبّر النتيجة 1 بالقول أن الدالة " $\ln$ " هي الدالة العكسية لـ " $\exp$ "

متابعة مناقشة النشاط

النقطتان $M(x; y)$ و $M'(y; x)$ متناظرتان بالنسبة إلى المنصف الأول أي المستقيم الذي معادلته $y = x$ لتكن $M(a; b)$ تنتمي إلى (C) وهذا يعني أن $e^a = b$ إذن $\ln(b) = a$ فإن $M'(b; a)$ تنتمي إلى (C') . نستنتج أن المنحنين (C) و (C') متناظرين بالنسبة إلى المنصف الأول ذي المعادلة $y = x$



الدالة $\ln$ متزايدة تماما على $]0; +\infty[$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

أضف إلى
معلوماتك

خاصية 1

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ التمثيلان البيانيان للدالتين الأسية واللوغاريتمية النيبيرية متناظران بالنسبة إلى المستقيم ذي المعادلة $y = x$ (المنصف الأول)

تطبيق

ليكن $(C_{\ln})$ التمثيل البياني للدالة $\ln$ في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وليكن (C_f) التمثيل البياني لدالة f
 بين في كل حالة من الحالات التالية كيفية رسم (C_f) ، ثم أرسمه

$$f(x) = -2 + \ln(x) \quad 1$$

$$f(x) = -\ln(x) \quad 2$$

$$f(x) = \ln(x - 2) \quad 3$$

$$f(x) = |\ln(x)| \quad 4$$

ملاحظات حول سير الدرس



.....

.....

.....



د20

ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

« الوحدة التعليمية: الدوال اللوغاريتمية »
 « ميدان التعلم: التحليل »
 « موضوع الحصة: خواص الدالة اللوغاريتمية »

« الأستاذ: بخدة أمين »
 « المستوى: السنة الثالثة رياضيات »
 « المدة: 1 ساعة »

« المكتسبات القبلية: خواص الدوال الأسية »
 « الكفاءات المستهدفة: حل معادلات و المتراجحات باستعمال خواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية »
 « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
مرحلة الإنطلاق	1 نشاط مقترح من أجل a و b من $]0; +\infty[$ 1 قارن بين $e^{\ln(ab)}$ و $e^{\ln(a)+\ln(b)}$ ، ماذا تستنتج؟ 2 بين أن: $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$ 3 إستنتج $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$ 4 بوضع $a = (\sqrt{a})^2$ ، إستنتج أن: $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$ مناقشة النشاط 1 لدينا: $e^{\ln(ab)} = ab$ ولدينا $e^{\ln(a)+\ln(b)} = e^{\ln(a)} \times e^{\ln(b)} = a \times b$ ومنه $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ الخاصية الأساسية خاصية 1 « من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$ ، $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ » ملاحظة: يتم تعميم هذه النتيجة إلى عدة أعداد حقيقية موجبة تماما و هكذا يكون لدينا: من أجل كل أعداد حقيقية $a_1, a_2, \dots, a_n$ من $]0; +\infty[$ $\ln(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n) = \ln(a_1) + \ln(a_2) + \dots + \ln(a_n)$ نتيجة « من أجل كل عدد حقيقي a من $]0; +\infty[$ ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n : $\ln(a^n) = n \ln(a)$ » متابعة مناقشة النشاط 2 $\ln(1) = \ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right) = 0$ ومنه $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$	مرحلة البناء

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) \quad \text{3}$$

$$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a) \text{ ومنه } 2\ln(\sqrt{a}) = \ln(a) \text{ إذن } \ln((\sqrt{a})^2) = 2\ln(\sqrt{a}) \text{ و } \ln((\sqrt{a})^2) = \ln(a) \quad \text{4}$$

ملاحظة: إذا كان x عدد حقيقي غير معدوم فإن $\ln(x^2) = 2\ln(|x|)$

اتجاه تغير الدالة اللوغاريتمية :

التقويم



10 دق

أضف إلى
معلوماتك

خاصية 1

الدالة اللوغاريتمية النيبيرية متزايدة تماماً على المجال $]0; +\infty[$

البرهان

a و b عدنان حقيقيان كفيان من $]0; +\infty[$ حيث $a < b$ ومنه $e^{lna} < e^{lnb}$ وبما أن الدالة الأسية متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ فإن $lna < lnb$

نتائج

من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$
 $a < b$ يعني $lna < lnb$ • $a = b$ يعني $lna = lnb$ •
 $0 < x < 1$ يعني $ln(x) < 0$ • $x > 1$ يعني $ln(x) > 0$ •

تطبيق 1

بسط العبارات التالية

$$\ln(16) - \ln(4) \quad \text{1}$$

$$\ln\left(\frac{5}{4}\right) - \ln\left(\frac{4}{5}\right) \quad \text{2}$$

$$\ln(10000) + \ln(0,01) \quad \text{3}$$

$$e^{\ln(4)} + e^{-\ln(2)} \quad \text{4}$$

تطبيق 2

أحسب بدلالة n المجموع

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) + \dots + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

تمرين منزلي 60 صفحة 106

ملاحظات حول سير الدرس



.....



20 دق

ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

الوحدة التعليمية: الدوال الأسية و اللوغاريتمية
 ميدان التعلم: التحليل
 موضوع الحصة: حل معادلات و متراجحات

الإستاذ: بخدة أمين
 المستوى: السنة الثالثة رياضيات
 المدة: 1 ساعة

المكتسبات القبلية: خواص الدوال الأسية و اللوغاريتم
 الكفاءات المستهدفة: حل معادلات و المتراجحات باستعمال خواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية
 المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	التهيئة النفسية تذكير بخواص الدالة اللوغاريتم حل المعادلات و المتراجحات طريقة أضف إلى معلوماتك حل معادلة من الشكل $\ln[u(x)] = a$ (متراجحة من الشكل $\ln[u(x)] < a$) نعين D مجموعة تعريف المعادلة (المتراجحة). نحل في D المعادلة $u(x) = e^a$ (المتراجحة $u(x) < e^a$). تطبيق حل في $\mathbb{R}$ المعادلات و المتراجحات التالية: $\ln(x) = 3$ ، $\ln(2x - 3) = 1$ ، $\ln(1 - x) - 1 = 0$ ، $\ln(-x^2 + 2x) < 0$ ، $\ln(x) + \ln(4) > 0$ طريقة أضف إلى معلوماتك حل معادلة من الشكل $\ln[u(x)] = \ln[v(x)]$ (متراجحة من الشكل $\ln[u(x)] < \ln[v(x)]$) نعين D مجموعة تعريف المعادلة (المتراجحة). نحل في D المعادلة $u(x) = v(x)$ (المتراجحة $u(x) < v(x)$). تطبيق 2 حل في $\mathbb{R}$ المعادلات و المتراجحات التالية: $\ln^2(x) - 1 = 0$ ، $\ln(2x - 3) = \ln(x + 4)$ ، $\ln(x) + \ln(4) = 0$ ، $\ln(1 - x) - \ln(3x) = 0$ ، $\ln(x) - \ln(x) < 0$ ، $\ln(-x^2 + 2x) > \ln(2x)$	30 د
مرحلة البناء	حل تمرين 67 و 68 صفحة 107 ملاحظات حول سير الدرس	30 د
تقويم		

education-onec-dz.blogspot.com

ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية و اللوغاريتمية »
 « ميدان التعلم: التحليل »
 « موضوع الحصة: دراسة الدالة اللوغاريتمية »

« الأستاذ: بخدة أمين »
 « المستوى: السنة الثالثة رياضيات »
 « المدة: 1 ساعة »


« المكتسبات القبلية: خواص الدالة الأسية »
 « الكفاءات المستهدفة: دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية »
 « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
مرحلة الإنطلاق	التهيئة النفسية تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسية النهايات 1 نشاط مقترح 1 بوضع $x = e^X$ إستنتج أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ 2 بوضع $x = e^X$ إستنتج أن $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ مناقشة النشاط 1 لما x يؤول إلى $+\infty$ فإن X يؤول إلى $+\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(e^X) = \lim_{X \rightarrow +\infty} X = +\infty$ 2 لما x يؤول إلى 0^+ فإن X يؤول إلى $-\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = \lim_{X \rightarrow -\infty} \ln(e^X) = \lim_{X \rightarrow -\infty} X = -\infty$ خواص $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ الإشتقاقية والإستمرارية خاصية الدالة $\ln$ مستمرة على المجال $]0; +\infty[$ 2 نشاط مقترح نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ ب: $f(x) = e^{\ln(x)}$ 1 أحسب $f'(x)$ بإستعمال مشتق مركب دالتين 2 إستنتج $\ln'(x)$ مناقشة النشاط 1 الدالة f قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ و دالتها المشتقة f' حيث $f'(x) = \ln'(x) e^{\ln(x)}$ 2 نعم أن من أجل كل x من $]0; +\infty[$ أي $f(x) = x$ أي $f'(x) = 1$ ومنه $\ln'(x) e^{\ln(x)} = 1$ $\ln'(x) = \frac{1}{e^{\ln(x)}} = \frac{1}{x}$	مرحلة البناء
15د		
15د		

الدالة $\ln$ قابلة للإشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ ، ومن أجل كل x من $]0; +\infty[$ لدينا: $\ln'(x) = \frac{1}{x}$

جدول تغيرات الدالة اللوغاريتمية

x	0	1	e	$+\infty$
$\frac{1}{x}$			+	
$\ln(x)$	$-\infty$	0	1	$+\infty$

التمثيل البياني للدالة $\ln$ 

ملاحظة:

المنحنى الممثل للدالة $\ln$ يقبل حامل محور الترتيب كمستقيم مقارب
المنحنى الممثل للدالة $\ln$ يقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة 1 معادلته $y = x - 1$
بإستعمال مفهوم العدد المشتق نجد: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$ أو $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(h+1)}{h} = 1$

نتيجة

الدالة $x \mapsto \ln(x+1)$ هي أحسن تقريب تألفي للدالة $x \mapsto \ln(x+1)$ بجوار 0
أي : من أجل x قريب من 0 لدينا : $\ln(x+1) \approx x$

تطبيق


لتكن الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = 1 - (\ln(x))^2$
أحسب نهاية الدالة f عند 0 و $+\infty$
أدرس إتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها
بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث : $0 < \alpha < 1$ و $2 < \beta < 3$
أرسم التمثيل البياني للدالة f في مستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

ملامح حول سير الدرس

ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(x)$ في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
 A نقطة من (C_f) فاصلتها m حيث m عدد حقيقي موجب تماما . و (Γ_m) مماس ل (C_f) في النقطة A .

1 أ) أثبت أن معادلة للمماس $y = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m)$ (Γ_m)

ب) تحقق أن المماس (Γ_e) للمنحنى (C_f) في النقطة $B(e;1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



2 لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m) - \ln(x)$

أ) أثبت أن الدالة g قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ و أحسب $g'(x)$.

ب) شكل جدول تغيرات الدالة g ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$

3 إستنتج مما سبق أن المنحنى (C_f) يقع تحت أي مماس له .

(II)

1 أ) إستنتج من الجزء (I) أنه من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تماما m و x يكون

$$\ln(x) \leq \ln(m) + \frac{x-m}{m}$$

ب) إستنتج من (أ) أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما m يكون $\ln(m+1) - \ln(m) \leq \frac{1}{m}$

(III)

1 أدرس إتجاه تغير الدالة f على $]0; +\infty[$ المعرفة بـ $f(x) = \ln(x) + x - 1$ وإستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي

$$\ln(x) \leq x - 1$$

2 أ) أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\ln(t+1) \leq t$

ب) بوضع : $x = \frac{1}{1+t}$ ، أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$

ج) إستنتج من أجل $t > -1$ صحة المتباينة : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$

(I) ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(x)$ في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نقطة من (C_f) فاصلتها m حيث m عدد حقيقي موجب تماماً . و (Γ_m) مماس ل (C_f) في النقطة A .

1 أ) أثبت أن $y = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m)$ معادلة للمماس (Γ_m)

ب) تحقق أن المماس (Γ_e) للمنحنى (C_f) في النقطة $B(e; 1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

2 لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m) - \ln(x)$

أ) أثبت أن الدالة g قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ و أحسب $g'(x)$.

ب) شكل جدول تغيرات الدالة g ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$

3 إستنتج مما سبق أن المنحنى (C_f) يقع تحت أي مماس له .

(II)

1 أ) إستنتج من الجزء (I) أنه من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تماماً x و m يكون $\ln(x) \leq \ln(m) + \frac{x-m}{m}$

ب) إستنتج من (أ) أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً m يكون $\ln(m+1) - \ln(m) \leq \frac{1}{m}$

(III)

1 أدرس إتجاه تغير الدالة f على $]0; +\infty[$ المعرفة بـ $f(x) = \ln(x) + x - 1$ و إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً x صحة المتباينة $\ln(x) \leq x - 1$

2 أ) أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\ln(t+1) \leq t$

ب) بوضع : $x = \frac{1}{1+t}$ ، أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$

ج) إستنتج من أجل $t > -1$ صحة المتباينة : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$

(I) ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(x)$ في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نقطة من (C_f) فاصلتها m حيث m عدد حقيقي موجب تماماً . و (Γ_m) مماس ل (C_f) في النقطة A .

1 أ) أثبت أن $y = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m)$ معادلة للمماس (Γ_m)

ب) تحقق أن المماس (Γ_e) للمنحنى (C_f) في النقطة $B(e; 1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

2 لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m) - \ln(x)$

أ) أثبت أن الدالة g قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ و أحسب $g'(x)$.

ب) شكل جدول تغيرات الدالة g ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$

3 إستنتج مما سبق أن المنحنى (C_f) يقع تحت أي مماس له .

(II)

1 أ) إستنتج من الجزء (I) أنه من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تماماً x و m يكون $\ln(x) \leq \ln(m) + \frac{x-m}{m}$

ب) إستنتج من (أ) أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً m يكون $\ln(m+1) - \ln(m) \leq \frac{1}{m}$

(III)

1 أدرس إتجاه تغير الدالة f على $]0; +\infty[$ المعرفة بـ $f(x) = \ln(x) + x - 1$ و إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً x صحة المتباينة $\ln(x) \leq x - 1$

2 أ) أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\ln(t+1) \leq t$

ب) بوضع : $x = \frac{1}{1+t}$ ، أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$

ج) إستنتج من أجل $t > -1$ صحة المتباينة : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$

ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

الوحدة التعليمية: الدوال الأسية واللوغاريتمية
 ميدان التعلم: التحليل
 موضوع الحصة: دراسة الدالة $\ln \circ u$

الإستاذ: بخدة أمين
 المستوى: السنة الثالثة رياضيات
 المدة: 1 ساعة

المكتسبات القبلية: النهايات، الاشتقاقية، اتجاه التغير، خواص الدالة اللوغاريتمية
 الكفاءات المستهدفة: دراسة الدالة $\ln \circ u$
 المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
مرحلة الإنطلاق	التهيئة النفسية تذكير بنهاية و مشتق مركب دالتين النهايات أضف إلى معلوماتك مبرهنة إذا a, b, c تمثل أعدادا حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$ نعتبر الدوال التالية $u, \ln x, f = \ln \circ u$ حيث $f = \ln \circ u$ معرفة وموجبة على مجال I إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ و $\lim_{x \rightarrow b} \ln x = c$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$ مثال $f(x) = \ln(x-4)$ دالة عددية معرفة على $]4; +\infty[$: لدينا : $\lim_{x \rightarrow 4^+} (x-4) = 0^+$ وبما أن $\lim_{X \rightarrow 0} \ln(X) = -\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow 4} \ln(x-4) = -\infty$ لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-4) = +\infty$ وبما أن $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(X) = +\infty$ تطبيق احسب $\lim_{x \rightarrow -1} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x-1}\right)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x^2+1) - \ln(x^2-1)]$ إتجاه التغير مبرهنة إذا كانت u دالة معرفة وموجبة تماما على مجال I فإن للدالتين u و $\ln \circ u$ نفس إتجاه التغير على المجال I البرهان بما أن الدالة $\ln$ متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$ فإن للدالتين $\ln \circ u$ و u نفس إتجاه التغير على I (حسب المبرهنة الخاصة بإتجاه تغير دالة مركب) مثال $f(x) = \ln\left(-\frac{1}{x}\right)$ دالة عددية معرفة على $]0; +\infty[$: لدينا $x \mapsto -\frac{1}{x}$ متزايدة تماما على $]0; +\infty[$ إذن الدالة f متزايدة تماما على $]0; +\infty[$	مرحلة بناء المعرفة

أضف إلى
معلوماتك

خاصية

إذا كانت u دالة قابلة للإشتقاق وموجبة تماماً على مجال I فإن الدالة $\ln \circ u$ قابلة للإشتقاق على I ولدينا من أجل كل x من I ، $(\ln \circ u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$

البرهان

لتكن u دالة قابلة للإشتقاق على I و موجبة تماماً من أجل كل x من I
لدينا : الدالة $\ln$ قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ إذن $\ln \circ u$ قابلة للإشتقاق على I
من أجل كل x من I $(\ln \circ u)'(x) = u'(x) (\ln' \circ u)(x) = u'(x) \ln' (u(x))$ ولدينا: $\ln'(x) = \frac{1}{x}$
أي $\ln'(u(x)) = \frac{1}{u(x)}$ ومنه $(\ln \circ u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$

ملاحظة: إذا كانت u سالبة على المجال I فإن

$$(\ln \circ |u|)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \quad \text{نتيجة} \quad (\ln \circ (-u))'(x) = \frac{-u'(x)}{-u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

مثال

عين مشتقة الدالة f في كل حالة

$$I =]1; +\infty[\quad f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \quad \text{1}$$

$$I = \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[\quad f(x) = \ln |2x-1| \quad \text{2}$$

$$I =]3; +\infty[\quad f(x) = \ln(x^2 - 3x) \quad \text{3}$$

تطبيق

نعتبر الدالة العددية f المعرفة $] -\infty; -2[\cup]2; +\infty[$ بـ: $f(x) = \ln |x^2 - x - 2|$
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أدرس تغيرات الدالة f

2 أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$

3 أنشئ (T) و (C_f) .

ملاحظات حول سير الدرس

ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية واللوغاريتمية »
 « ميدان التعلم: التحليل »
 « موضوع الحصة: دالة اللوغاريتم العشري »

« الأستاذ: بخدة أمين »
 « المستوى: السنة الثالثة رياضيات »
 « المدة: 1 ساعة »

« المكتسبات القبلية: خواص الدالة اللوغاريتم النيبيري »
 « الكفاءات المستهدفة: خواص الدالة اللوغاريتم العشري وتطبيقاتها »
 « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »


المرحلة	عناصر الدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	1 نشاط مقترح تعريف نسمي دالة اللوغاريتم العشري الدالة التي يرمز إليها بالرمز $\log$ والمعرفة على $]0, +\infty[$ بـ: $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ 1 أحسب $\log(1)$ ، $\log(10)$ 2 أثبت من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0, +\infty[$ ومن أجل كل عدد صحيح n $\log(ab) = \log(a) + \log(b) \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b) \quad \log(a^n) = n \log(a)$ 3 (اعتماد على دالة $\ln$) أدرس إتجاه تغير الدالة $\log$ ، ثم أشرح كيف يمكن إنشاء منحناها البياني مناقشة النشاط 1 $\log(10) = \frac{\ln(10)}{\ln(10)} = 1$ ، $\log(1) = \frac{\ln(1)}{\ln(10)} = 0$ 2 $\log(ab) = \frac{\ln(ab)}{\ln(10)} = \frac{\ln(a) + \ln(b)}{\ln(10)} = \frac{\ln(a)}{\ln(10)} + \frac{\ln(b)}{\ln(10)} = \log(a) + \log(b)$ $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\ln\left(\frac{a}{b}\right)}{\ln(10)} = \frac{\ln(a) - \ln(b)}{\ln(10)} = \frac{\ln(a)}{\ln(10)} - \frac{\ln(b)}{\ln(10)} = \log(a) - \log(b)$ $\log(a^n) = \frac{\ln(a^n)}{\ln(10)} = \frac{n \ln(a)}{\ln(10)} = n \log(a)$ 3 إتجاه تغير لدينا: $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$ $10 > 1$ و منه $\ln(10) > 0$ إذن $\frac{1}{\ln(10)} > 0$ لدينا الدالة $\ln$ متزايدة تماما على المجال $]0, +\infty[$ ومنه الدالة $\frac{\ln}{10}$ متزايدة تماما على المجال $]0, +\infty[$ إذن الدالة $\log$ متزايدة تماما على $]0, +\infty[$ (تترك للتلميذ بإستعمال المشتق) النهايات $\lim_{x \rightarrow 0} \log(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{\ln(10)} = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\ln(10)} = +\infty$	25د

جدول تغيرات الدالة اللوغاريتم العشري

x	0	1	10	$+\infty$
$\log'(x)$			+	
$\log(x)$	$-\infty$	0	1	$+\infty$

التمثيل البياني للدالة اللوغاريتم العشري $\ln$

نضرب ترتيب النقطة من $(C_{\ln})$ فاصلتها x في العدد $\frac{1}{\ln(10)}$



بعض إستعمالات اللوغاريتم العشري

في الكيمياء : تقاس درجة حموضة محلول بال PH الذي يساوي $PH = -\log [H_3O^+]$ حيث $[H_3O^+]$ هو تركيز شوارد H_3O^+ في المحلول مقاسة بواحد مول في اللتر .

1 ماهي قيمة PH علما أن المحلول يحتوي على 5×10^{-8} من شوارد H_3O^+ في اللتر الواحد .

2 ماهو التركيز المولي بشوارد H_3O^+ لمحلول معتدل ($PH = 1$) ؟

في علم الزلازل يشير المقدار I_0 إلى شدة قاعدية مرجعية ، و عندها نقول إن درجة زلزال شدته I تساوي M

إذا علمت أن $M = \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$ ، فما درجة الزلزال الذي وقع في لوس انجلوس عام 1971 إذا علمت أن

$$I = 50,01 \times 10^6 I_0$$

في علم الصوتيات تعطى الشدة I مقاسة بالدسيبل لصوت إستطاعته P بالصيغة $10 \log \left(\frac{P}{P_0} \right)$ حيث تمثل P_0

حد الصوت المسموع به ، الذي لا يسمع أي صوت إستطاعته أدنى منه .

معرفة عدد الأرقام في الكتابة العشرية

نعتبر العدد الطبيعي n حيث : $n = 2^{1234}$

1 عيّن بإستعمال حاسبة الجزء الصحيح للعدد $\log(n)$.

2 إستنتج الحصر التالي : $10^{371} \leq n < 10^{372}$.

3 حدد عدد الأرقام في الكتابة العشرية للعدد n .



10 د



10 د



15د

تطبيق

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية :

1 $\log(x) = 4$

2 $\log(x) = -3$

3 $\log(x) = 0,01$

4 $\log(x) < -10$

5 $\log(x) < \log(1-x)$

تمرين من رلي

1 أحسب المجموع التالي :

$$S = \log\left(\frac{1}{2}\right) + \log\left(\frac{2}{3}\right) + \log\left(\frac{3}{4}\right) + \log\left(\frac{4}{5}\right) + \log\left(\frac{5}{6}\right) + \log\left(\frac{6}{7}\right) + \log\left(\frac{7}{8}\right) + \log\left(\frac{8}{9}\right) + \log\left(\frac{9}{10}\right)$$

2 حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $\log\left(\frac{x+3}{x-4}\right) - 1 < 0$

3 حل في $\mathbb{R}^2$ الجملة التالية :
$$\begin{cases} x + y = 65 \\ \log(x) + \log(y) = 3 \end{cases}$$

ملاحظات حول سير الدرس



.....

.....

.....

ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

الإستاذ : بخدة أمين

المستوى : السنة الثالثة رياضيات

المدة : 1 ساعة

الوحدة التعليمية: الدوال الأسية و اللوغاريتمية

ميدان التعلم: التحليل

موضوع الحصة : حل معادلة تفاضلية من الشكل

$$y' = ay + b$$

المكتسبات القبلية : خواص الدالة الأسية

الكفاءات المستهدفة : حل معادلة تفاضلية من الشكل $y' = ay + b$

المراجع : الكتاب المدرسي ، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المدة
1	التهيئة النفسية التذكير بأهمية المعادلات التفاضلية تمهيد المعادلة التفاضلية هي معادلة المجهول فيها دالة نرسم إليها غالبا بالرمز y ، z ، ... كل معادلة تشمل الدالة ومشتقتها نسميها معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى . حل معادلة تفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ يعني البحث عن كل الدوال القابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ والتي تحقق : $f'(x) = af(x) + b$ 1 نشاط مقترح لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = Ce^{ax}$ مع C عدد حقيقي ثابت . أحسب $f'(x)$ ، ثم تحقق أن الدالة f حل للمعادلة التفاضلية : $y' = ay$ المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = ay$ مع $a \neq 0$ مبرهنة أضف إلى معلوماتك « a عدد حقيقي غير معدوم حلول المعادلة $y' = ay$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $x \mapsto ce^x$ ، حيث C عدد حقيقي ثابت . مثال لنحل في $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية : $y' + 2y = 0$ لدينا : $y' + 2y = 0$ معناه $y' = -2y$ ومنه حلول هذه المعادلة هي الدوال : $x \mapsto ce^{2x}$ حيث C عدد حقيقي ثابت المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ مع $a \neq 0$ مبرهنة أضف إلى معلوماتك « a عدد حقيقي غير معدوم حلول المعادلة $y' = ay + b$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $x \mapsto ce^x - \frac{b}{a}$ ، حيث C عدد حقيقي ثابت .	10 د 5 د 10 د 10 د

مثال

لنحل في $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية : $y' = -3y + 2$
 حلول هذه المعادلة هي الدوال $x \mapsto Ce^{-3x} + \frac{2}{3}$

أضف إلى

معلوماتك

من أجل كل ثنائية الأعداد حقيقية $(x_0; y_0)$ ، المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ مع $a \neq 0$ تقبل حلا وحيدا يحقق : $f(x_0) = y_0$

تطبيق

نعتبر المعادلة التفاضلية $2y' + y = 1$ (E)

1 حل في $\mathbb{R}$ المعادلة (E)

2 عيّن الحل الخاص للمعادلة (E) بحيث $f(-1) = 2$

3 أدرس تغيرات الدالة f ، ثم أرسم تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

حل تمرين 106-105-102 صفحة 110-109

ملاحظات حول سير الدرس



.....

.....

.....