

$$\pm^3 \in \bullet, f, \dots, \dagger$$

† ə ü b æ ʔ ʒ ɔ

: ††^ „... %Š D ' Hb pſ = y pſ 3/4 p"ûÿpàp; pŽpÔ p2p3 ' p"pſ

[illegible]

:pòbçbŽpœpß ' p

0 ~ đ+č ,ç• q p"pß 'p^apß ' pôb~ûpbž

. ǃ, 5 ; 3, ǃ 'TM—, ... £Ÿp^aüyb£g(x)ǃǃp£p"pß /bžpì(ǃǃpàpß

$$f(x) \approx \frac{\ln x}{x} : \text{pòpàùñ, pòpàùñ, ... ž“• <Ÿžf•, ..., ..., žd•f•“...††}$$

ð+č̃ 0 ,¢•f p"pß 'p^apß ' p@p~ûppž

y d1 < „™ f „... d d d « p a u y b o p ~ b ' p a o p ' p d d y b i b p k b o 3 b e b p

$$f(a) \cdot f(b) = \dots = f(a) \cdot f(b) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} = \frac{1}{ab}$$

1 < "±™².... ¢...¢.... (©) ž¢(£¢(¤) 3bŽbäbäbß '(6)"bßba

(C) $\check{z} \in \mathbb{C}^{\bullet}$, (D) $\gamma \in \mathbb{T}^{\mathbb{M}^{\bullet}}$, ... $\wedge \{7..$

$$h(x) = f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ s.t. } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

pŽû-p—'p®ÿpDp-e”pD’pPpYpœpüDpH°•GpŽk,b.....!pž~pè