

1^{as}

أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

عموميات على الدوال

◀ ملخص الدرس + تطبيقات ▶ تمارين مقترحة



جمعها لكم الأستاذ شعبان أسامة

1.

ملخص الدرس

+

أمثلة مرفقة

D جزء من مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.
تعريف دالة f على D هو إرفاق بكل عدد حقيقي x من D ، عددا حقيقيا وحيدا يسمى صورة x

مصطلحات و ترميز

- ❖ يسمى الجزء D مجموعة تعريف الدالة f .
- ❖ نرمز إلى صورة عدد حقيقي x من D بالرمز $f(x)$ و نقرأ " f لـ x "
- ❖ إذا كان $y = f(x)$ نقول " x سابقة للعدد y بالدالة f "
- ❖ للتعبير عن الدالة f المعرفة على D يمكن أن نكتب: $f: x \mapsto f(x)$

أمثلة

مثال 1

إذا أرفقنا بكل عدد حقيقي x من المجال $[-1; +\infty[$ العدد الحقيقي $\sqrt{x+1}$ نكون قد عرفنا دالة f على المجال $D = [-1; +\infty[$.

و يمكن أن نعبر بإحدى الطريقتين:

$$\begin{aligned} \square \quad f \text{ هي الدالة المعرفة على } [-1; +\infty[\text{ بـ: } f(x) = \sqrt{x+1} \\ \square \quad f: [-1; +\infty[\rightarrow \\ x \mapsto \sqrt{x+1} \end{aligned}$$

مثال 2

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2 + 2x - 3$

$\square$ لدينا: $g(2) = 2^2 + 2 \cdot 2 - 3 = 5$. إذن صورة العدد 2 هي العدد 5.

$\square$ لدينا: $g(-3) = 0$ و $g(1) = 0$. إذن -3 و 1 سابقتان للعدد 0.

ملاحظة: لكل عدد حقيقي من مجموعة التعريف صورة وحيدة بينما يمكن أن يكون لصورة عدة سوابق.

2. المنحني الممثل لدالة

تعريف


f دالة معرفة على جزء D من $\mathbb{R}$.
في معلم $(O; I; J)$ للمستوي، المنحني الممثل (أو التمثيل البياني) (C_f) للدالة f هو مجموعة النقاط $M(x; y)$ حيث: $x \in D$ و $y = f(x)$
 $y = f(x)$ هي معادلة للمنحني (C_f) في المعلم $(O; I; J)$

$$y = f(x) \text{ و } x \in D \text{ يكافئ } M(x; y) \in (C_f)$$

(C_f) المرسوم أدناه هو التمثيل البياني في معلم $(O; I; J)$ ، للدالة f المعرفة على المجال

$$[-2; 3] \text{ كما يلي: } f(x) = x^2 - x - 3$$

$$\text{معادلة } (C_f) \text{ هي: } y = x^2 - x - 3$$



نقرأ مثلاً أن صورة العدد 0 هي -3 و أن صورة العدد -1 هي -1 كما نقرأ أن للعدد 3 سابقتان هما: -2 و 3 .

النقطة $A(1; -3)$ تنتمي إلى المنحني (C_f) لأن العدد 1 ينتمي إلى المجال $[-2; 3]$

$$\text{و } f(1) = 1^2 - 1 - 3 = -3$$

3. تغيرات دالة على مجال

☒ لتجاه تغير دالة

تعريف

دالة معرفة على مجال I من $(O; I; J)$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم

f متزايدة تماماً على I يعني أنه من أجل كل عددين حقيقيين x_1 و x_2 من I ،



$$\text{إذا كان } x_1 < x_2 \text{ فإن } f(x_1) < f(x_2)$$

f متناقصة تماماً على I يعني أنه من أجل كل عددين حقيقيين x_1 و x_2 من I ،

$$\text{إذا كان } x_1 < x_2 \text{ فإن } f(x_1) > f(x_2)$$

f ثابتة على I يعني أنه من أجل كل عددين حقيقيين x_1 و x_2 من I ،


$$f(x_1) = f(x_2)$$



f متزايدة تماماً على $[0; 4]$

f متناقصة تماماً على $[0; 2]$


ملاحظة: الدالة المتزايدة تحافظ على الترتيب بينما الدالة المتناقصة تعكسه.



مثال: المنحني (C_f) المرسوم في الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة على المجال $[-4; 3]$. لدينا:
 f متزايدة تماماً على المجال $[-4; -2]$
 f ثابتة على المجال $[-2; 1]$
 f متناقصة تماماً على المجال $[1; 3]$

جدول التغيرات

دراسة تغيرات دالة f يعني تعيين أكبر المجالات التي تكون عليها f متزايدة، متناقصة أو ثابتة. تلخص هذه الخواص في جدول يسمى "جدول التغيرات"



مثال

المنحني (C_f) المرسوم في الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة على المجال $[-2; 1]$
الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[-2; 0]$
و متزايدة تماماً على المجال $[0; 1]$.
جدول تغيرات f هو كالتالي:

x	-2	0	1
$f(x)$	3	-1	0

القيم الحدية

تعريف

ردالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم $(O; I; J)$.


a عنصر من المجال I

* قول أن $f(a)$ هي القيمة الحدية العظمى للدالة f على I يعني:

من أجل كل عدد x من I ، $f(x) \leq f(a)$

* قول أن $f(a)$ هي القيمة الحدية الصغرى للدالة f على I يعني:

من أجل كل عدد x من I ، $f(a) \leq f(x)$



- المنحني (C_f) المرسوم في الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة على المجال $[-2; 2]$
- الدالة f تقبل عند -1 قيمة حدية عظمى هي $3 - f(-1)$ على المجال $[-2; 0]$
- الدالة f تقبل عند 1 قيمة حدية صغرى هي $-1 - f(1)$ على المجال $[\frac{1}{2}; 2]$ مثلاً .

ملاحظات

- القيمة الحدية لدالة على مجال هي عدد حقيقي.
- يمكن أن تبلغ دالة قيمتها الحدية العظمى أو الصغرى على مجال عند أكثر من عنصر واحد من هذا المجال.

- الدالة f متناقصة على المجال $[a; c]$ و متزايدة على المجال $[c; b]$ و منه فهي تقبل قيمة حدية صغرى عند القيمة c . القيمة الحدية الصغرى هي $f(c)$.

x	a	c	b
$f(x)$	$f(a)$	$f(c)$	$f(b)$

- الدالة f متزايدة على المجال $[a; c]$ و متناقصة على المجال $[c; b]$ و منه فهي تقبل قيمة حدية عظمى عند القيمة c . القيمة الحدية العظمى هي $f(c)$.

x	a	c	b
$f(x)$	$f(a)$	$f(c)$	$f(b)$

- إذا كانت دالة f متزايدة تماماً على المجال $[a; b]$ فإنها تبلغ قيمتها الحدية الصغرى عند a و تبلغ قيمتها الحدية العظمى عند b .
- إذا كانت دالة f متناقصة تماماً على المجال $[a; b]$ فإنها تبلغ قيمتها الحدية الصغرى عند b و تبلغ قيمتها الحدية العظمى عند a .

4. شفقية دالة

تعريف

f دالة معرفة على جزء D من $\mathbb{R}$.

* نقول عن f أنها دالة زوجية إذا وفقط إذا تحقق ما يلي:
من أجل كل x من D لدينا: $-x \in D$ و $f(-x) = f(x)$

* نقول عن f أنها دالة فردية إذا وفقط إذا تحقق ما يلي:
من أجل كل x من D لدينا: $-x \in D$ و $f(-x) = -f(x)$

مثال 1 الدالة f المعرفة على المجال $[-3; 3]$ بـ: $f(x) = x^2 - 2$ دالة زوجية لأن:

من أجل كل x من $[-3; 3]$ لدينا: $-x \in [-3; 3]$ و $f(-x) = f(x)$

$$(f(-x) = (-x)^2 - 2 = x^2 - 2 = f(x)) \text{ و } (-3 \leq -x \leq 3) \text{ يستلزم } (-3 \leq x \leq 3)$$

مثال 2 الدالة g المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -x^3 + 2x$ دالة فردية لأن:

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا: $-x \in \mathbb{R}$ و $g(-x) = -g(x)$

$$(x \in \mathbb{R} \text{ يستلزم } -x \in \mathbb{R}) \text{ و } (g(-x) = -(-x)^3 + 2(-x) = x^3 - 2x = -(-x^3 + 2x) = -g(x))$$

مثال 3 الدالة h المعرفة على المجال $[-5; +\infty[$ بـ: $h(x) = x^2 + 1$ ليست زوجية و لا فردية لأن مثلا

$$6 \in [-5; +\infty[\text{ بينما } -6 \notin [-5; +\infty[$$



مثال 4 الدالة k المعرفة على المجال $[-4; 4]$ بـ: $k(x) = x^2 + x$ ليست زوجية و لا فردية لأن مثلا

$$(k(-1) = 0 \text{ و } k(1) = 2) \text{ و } (k(-1) \neq -k(1) \text{ و } k(-1) \neq k(1))$$

ملاحظة

منحنى دالة زوجية في معلم متعاود يكون متناظرا بالنسبة إلى محور الترتيب.

منحنى دالة فردية في معلم كفي يكون متناظرا بالنسبة إلى مبدأ المعلم



تمرين محلول 1

حساب صورة عدد حقيقي بدالة معرفة بدستور

النص:

f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + x + 2$
احسب بواسطة الدالة f صورة كل من -3 و $\frac{3}{2}$

الحل:

$$f(-3) = (-3)^2 + (-3) + 2 = 9 - 3 + 2 = 8$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right) + 2 = \frac{9}{4} + \frac{3}{2} + 2 = \frac{23}{4}$$

طريقة

لحساب صورة عدد حقيقي a بواسطة دالة f ، نعوض x بالعدد الحقيقي a في عبارة $f(x)$

تمرين محلول 2

حساب «سوابق» عدد حقيقي بدالة معرفة بدستور

النص:

f هي الدالة المعرفة على $[-1; 3]$ بـ: $f(x) = x^2 - 3$
أحسب بواسطة الدالة f ، في حالة وجودها، سوابق العدد الحقيقي 1.

الحل:

لنعين الأعداد الحقيقية x من $[-1; 3]$ التي تحقق: $f(x) = 1$

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow x^2 - 3 = 1 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \text{ أي } x^2 - 4 = 0$$


$$x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+2) = 0 \text{ أي } x = 2 \text{ أو } x = -2$$

نلاحظ أن $2 \in [-1; 3]$ بينما $-2 \notin [-1; 3]$.

إن للعدد الحقيقي 1 سابقة وحيدة هي 2

طريقة

لحساب سوابق عدد حقيقي b بواسطة دالة f معرفة على جزء D من $\mathbb{R}$ يكفي حل المعادلة، ذات المجهول x ، $f(x) = b$ في D .



المنحني (C_f) المرسوم في الشكل

المقابل هو التمثيل البياني لدالة f . أجب عن

الأسئلة التالية بالقراءة على المنحني (C_f).

1. عين D مجموعة تعريف الدالة f
2. ما هي صورة العدد -1 بواسطة الدالة f ؟
3. عين العدد $f(0)$
4. عين الأعداد التي صورها العدد -3 بـ f
5. حل بيانيا المعادلة $f(x) = 1$
6. حل بيانيا المتراجحة $f(x) \geq 1$

الحل:

1. مجموعة تعريف الدالة f هي: $D = [-3; 2]$
2. ترتيب نقطة المنحني (C_f) التي فاصلتها -1 هو 3. إذن صورة -1 هي 3
3. $f(0) = 1$ لأن 3 هو ترتيب نقطة المنحني (C_f) التي فاصلتها 0
4. نقطتان من (C_f) ترتيبهما -3. فاصلتا هاتين النقطتين هما -3 و 2. إذن يوجد عدداً صورتاهما -3 هما -3 و 2.
5. نرسم في نفس المعلم السابق المستقيم ذو المعادلة: $y = 1$. نلاحظ وجود نقطتي تقاطع مع المنحني (C_f)، نقرأ فاصلة كل من هاتين النقطتين. للمعادلة $f(x) = 1$ حلان: -2 و 1
- مجموعة الحلول هي إذن: $S = \{-2; 1\}$
6. ننظر إلى نقط المنحني (C_f) التي ترتيبها أكبر من أو يساوي 1. فواصل هذه النقط هي حلول المتراجحة $f(x) \geq 1$. نقرأ: $-2 \leq x \leq 1$. مجموعة الحلول هي إذن: $S = [-2; 1]$


طريقة

نقرأ السوابق على محور الفواصل بينما نقرأ الصور على محور الترتيب


التعرف على منحن يمثل دالة

النص:



من بين المنحنيات التالية بين تلك التي تمثل دالة عددية محددا مجموعة تعريفها.



الشكل 2



الشكل 1



الحل:

1. المنحني المرسوم في الشكل 1 لا يمثل دالة و إلا فسوف يكون - مثلا - للعدد 1 صورتان و هذا يتناقض مع تعريف دالة عددية. (المستقيم ذو المعادلة $x = 1$ يقطع المنحني في نقطتين).
2. المنحني المرسوم في الشكل 2 يمثل دالة مجموعة تعريفها $[-2, 4]$ لأن لكل عنصر α من هذا المجال صورة وحيدة. (المستقيم ذو المعادلة $x = \alpha$ يقطع المنحني في نقطة وحيدة ترتيبها هي صورة α).
3. المنحني المرسوم في الشكل 3 يمثل دالة مجموعة تعريفها $[-3, 2]$.
4. المنحني المرسوم في الشكل 4 لا يمثل دالة.

تمرين محلول 5

رسم منحن متلائم مع جدول تغيرات

النص:

x	-3	-2	0	2
$f(x)$	-2	2	-1	3


جدول التغيرات الموالي هو لدالة f .

1. ما هي مجموعة تعريف الدالة f ؟
2. حدد اتجاه تغير الدالة f .
3. ارسم منحن يمكن أن يكون التمثيل البياني للدالة f .

1. مجموعة التعريف D للدالة f نقرأ من السطر " x " لجدول التغيرات و منه: $D = [-3; 2]$
2. من خلال جدول التغيرات فإن الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[-2; -3]$ ، متناقصة تماماً على المجال $[0; -2]$ و متزايدة تماماً على المجال $[2; 0]$.
3. المنحني المرسوم أعلاه هو تمثيل بياني ممكن للدالة f .

ملاحظة:

لا توجد طريقة وحيدة لرسم تمثيل بياني متلائم مع جدول تغيرات معطى.



تمرين محلول 6

دراسة اتجاه تغير دالة معرفة بدستور

النص:

نعتبر الدالة f المعرفة على كما يلي:

$$f(x) = x^2 + 4x - 5$$

1. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f(x) = (x+2)^2 - 9$
2. ادرس اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $[-2; +\infty[$ و $]-\infty; -2]$

الحل:

1. من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

$$\begin{aligned} (x+2)^2 - 9 &= (x^2 + 4x + 4) - 9 \\ &= x^2 + 4x + 4 - 9 \\ &= x^2 + 4x - 5 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

و منه لدينا من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = (x+2)^2 - 9$

2. ليكن x_1 و x_2 عدنان حقيقيين

□ نفرض x_1 و x_2 عنصرين من المجال $[-2; +\infty[$ حيث: $x_1 < x_2$ لدينا إذن: $-2 \leq x_1 < x_2$ ومنه $0 \leq x_1 + 2 < x_2 + 2$ و بالتالي: $(x_1 + 2)^2 < (x_2 + 2)^2$ ومنه $(x_1 + 2)^2 - 9 < (x_2 + 2)^2 - 9$ وهكذا: $f(x_1) < f(x_2)$

إن الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[-2, +\infty[$.

□ نفرض x_1 و x_2 عنصرين من المجال $]-\infty, -2]$ حيث: $x_1 < x_2$

لدينا إذن: $x_1 < x_2 \leq -2$ ومنه $x_1 + 2 < x_2 + 2 \leq 0$

و بالتالي: $(x_1 + 2)^2 > (x_2 + 2)^2$ ومنه $(x_1 + 2)^2 - 9 > (x_2 + 2)^2 - 9$


وهكذا: $f(x_1) > f(x_2)$

إن الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[-2, +\infty[$.

تمرين مطول 7

القراءة على منحني للقيم الحدية للدالة على مجال

النص:



المنحني (C_f) المرسوم في الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f المعرفة على المجال $[-3; 2]$. أجب عن الأسئلة التالية بالقراءة على المنحني (C_f) .

- ما هما القيمتان الحديتان العظمى والصغرى للدالة f على المجال $[-3; 2]$.
و من أجل أي قيم تبلغ الدالة f هاتين القيمتين.
- حدد اتجاه تغير الدالة f .
- شكل جدول تغيرات الدالة f .

الحل:

1. من أجل كل x من $[-3; 2]$ ، $f(x) \leq 4$ و $f(-1) = 4$. إذن القيمة الحدية العظمى للدالة f هي 4 و يتم بلوغها من أجل $x = -1$.

من أجل كل x من $[-3; 2]$ ، $0 \leq f(x)$ و $f(1) = 0$. إذن القيمة الحدية الصغرى للدالة f هي 0 و يتم بلوغها من أجل $x = 1$.

2. الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[-3; -1]$ ، متناقصة تماماً على المجال $[-1; 1]$ و متزايدة تماماً على المجال $[1; 2]$.


3. جدول تغيرات الدالة f هو كالتالي:

x	-3	-1	1	2
$f(x)$	1	4	0	1

الحل البياني لمعادلات من الشكل $f(x) = g(x)$ و لمتراجحات من الشكل $f(x) \geq g(x)$

نعتبر الدالتين f و g العرقتين على المجال $[-2; 2]$ وليكن (C_f) و (C_g) منحنياهما في معلم $(O; x; y)$. (أنظر الشكل)

1. حل في المجال $[-2; 2]$ المعادلة $f(x) = g(x)$
2. حل في المجال $[-2; 2]$ المتراجحة $f(x) < g(x)$



الحل:

1. المنحنيان (C_f) و (C_g) يتقاطعان في نقطتين فاصلتاها -1 و 1 على الترتيب. و بالتالي فمجموعة

حلول المعادلة $f(x) = g(x)$ هي: $S = \{-1; 1\}$

2. يقع المنحني (C_f) أسفل المنحني (C_g) لمل يكون x محصورا بين -1 و 1 . و بالتالي فمجموعة

حلول المتراجحة $f(x) < g(x)$ هي: $S =]-1; 1[$


طريقة

لحل بيانيا متراجحة من الشكل $f(x) \geq g(x)$ ، ننظر إلى وضعية المنحني الممثل للدالة f بالنسبة إلى المنحني الممثل للدالة g

2.

سلسلة

تعاريف



المنحني $\mathcal{C}$ يمثل الدالة f المستقيم D يمثل الدالة g
بقراءة بيانية أجب عن الأسئلة:


1. أوجد مجموعة تعريف الدالة f
2. أوجد صور الأعداد -1 ، 4 و 8 بالدالة f
3. أوجد سابقتي العددين 2 و -2 بالدالة f
4. حل المعادلتين $f(x) = 0$ و $f(x) = 6$
5. حل المتراجحة: $f(x) \leq 2$
6. حل المعادلة $f(x) = g(x)$ ثم $f(x) \leq g(x)$
7. شكل جدول تغيرات الدالة f
8. حدد إشارة $f(x)$ في المجال: $[-3; 9]$
9. إذا علمت أن الدالة g دالة تآلفية . أوجد دستور الدالة g

التمرين الثاني:

الجزء الأول: f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بالشكل: $f(x) = x^2 - 2x - 3$

1. احسب صور الأعداد 3 ، -2 ، -1 و 4 بالدالة f .
 2. احسب سوابق العدد -3 ثم استنتج مما سبق سوابق العدد 5 بالدالة f .
 3. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f(x) = (x-1)^2 - 4$
 4. أثبت أن الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[1; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على المجال $]-\infty; 1]$
- الجزء الثاني:** من أجل معرفة نقط تقاطع (C_f) فإننا نحل المعادلة $f(x) = 0$ لكن سوف يكون الحل
بيانياً. لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2$ وليكن (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد
ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ الشكل موجود في الوثيقة المرفقة .

1. حدد من البيان شفعية الدالة g مع التبرير.
2. لتكن الدالة h الدالة التآلفية ذات معامل التوجيه 2 تمثيلها البياني (C_h) يشمل النقطة $A(-1; 1)$
أكتب عبارة الدالة h .
3. تحقق أن من أن $g(x) - h(x) = f(x)$
4. أنشئ (C_h) في الوثيقة المرفقة. ثم حل بيانياً المعادلة: $g(x) = h(x)$. ماذا تستنتج بالنسبة لـ (C_f)
5. حدد من البيان الوضع النسبي لكل من (C_h) و (C_g) ماذا تستنتج



f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي: $f(x) = 2x^2 + 7x$

(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد $(O; \vec{i}, \vec{j})$

الجزء الأول:


بقراءة بيانية أوجد ما يلي:

- صورة كل من الأعداد 2، $(-3, 5)$ ، 0.
- هل للعدد 0 سوابق؟ حددها إذا كانت الإجابة بنعم.
- حل بيانيا المعادلة $2x^2 + 7x = 22$. ثم المتراحة: $f(x) < 0$.
- شكل جدول تغيرات الدالة f .

الجزء الثاني:

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي: $g(x) = -3x + 4$

- ماهي صورة العدد (-3) بالدالة g .
- حدد ان أمكن سابقة أو سوابق العدد 5 بالدالة g .
- بين ان الدالة g متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.



التمرين الرابع:

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$

1. أدرس شفعية الدالة f .

2. أحسب $f(-1)$, $f(2)$, ثم استنتج قيمتي $f(1)$ و $f(-2)$.

3. حل في $\mathbb{R}^*$ المعادلة: $f(x) = 2x$

4. إذا كان جدول تغيرات الدالة g موضح كما يلي:

x	-3	1	2	4
$g(x)$	3		2	0
		↘	↗	↘
		-4		

أذكر المجالات التي تقبل فيها الدالة g قيما حدية وما هي؟

ب. حل المعادلة $g(x) = 0$ ، ثم أنشئ المنحني (C_g) الممثل للدالة g في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

التمرين الخامس:

لتكن f الدالة المعرفة بمنحنائها البياني في

معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو موضح في الشكل

المقابل.

باستعمال المعلومات الواردة في الشكل،

أجب على الأسئلة التالية:

1- عتبر مجموعة تعريف الدالة f ولتكن D_f .

2- ما هي صور (-2) و 1 و 5 بالدالة f ؟

3- ما هي السوابق الممكنة لـ (-4) و 3 و 5 بالدالة f ؟


4- ما هي القيمة الحدية الصغرى للدالة

5- أعط جدول تغيرات f .

6- ماذا تلاحظ بالنسبة لشفعية الدالة f بزر.

7- حل في المجموعة D_f المعادلتين $f(x) = 0$ و $f(x) = -5$

حل المجموعة D_f المتراحتين $f(x) < 0$ و $f(x) \geq -3$.



الجزء الأول:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]-3; 5[$ - الممثلة بيانيا بالمنحني (C_f) بقراءة بيانية: أوجد:


1. صور الأعداد 0 و 2 بالدالة f .
2. السوابق الممكنة للعدد 0 و -2 بالدالة f .
3. حلول المعادلة $f(x) = 3$.

4. لتكن الدالة g المعرفة بـ: $g(x) = 2x + 1$.
أ / ارسم التمثيل البياني (C_g) للدالة g في الوثيقة المرفقة.
ب / اوجد نقط تقاطع (C_f) و (C_g) .

الجزء الثاني:

يعطى دستور الدالة f كما يلي: $f(x) = 4 - (x - 1)^2$

1. انشر وبسط عبارة $f(x)$.
2. حل عبارة $f(x)$ ثم بين أنه: $f(x) = (x + 1)(3 - x)$.
3. احسب $f(2)$ و $f(-\sqrt{3})$.
4. استنتج مما سبق سوابق العدد 0 بالدالة f .

**الجزء الأول:**


لتكن الدالة العددية f المعرفة بـ: $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. أوجد أكبر مجموعة للتعريف للدالة f .
2. احسب صور الأعداد 3، -1، -2 بالدالة f .
3. أحسب السوابق الممكنة للعدد 3 بالدالة f .

الجزء الثاني:

لتكن الدالة g المعرفة بتمثيلها البياني (الشكل المقابل) بقراءة بيانية أوجد ما يلي:

1. مجموعة تعريف الدالة g .
2. صورة كل من الأعداد 2، -1، 0.
3. هل للعدد 0 سوابق؟ حددها إذا كانت الاجابة بنعم.
4. استنتج اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; 2]$.



لتكن الدالة f المعرفة كالآتي: $f(x) = x^2 - 2x - 1$ و بجدول تغيراتها الموالي:

x	-1	1	$\frac{7}{2}$
$f(x)$	2	-2	4

أ- عين مجموعة تعريف الدالة f .

ب- احسب صورة كل من 0 و 2.

ج- احسب السوابق الممكنة للعدد -1 بالدالة f .

د- استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $\left[-1; \frac{7}{2}\right]$:

هـ- ماذا يمثل العدد -2 في جدول تغيرات الدالة f ؟

بالتوفيق للجميع

