




على التلميذ أن يجيب على التمارين التالية

التمرين الأول (5 نقاط):

إن العصبونات، خلايا مميزة للجهاز العصبي، وهي دعامة إنتشار الرسالة العصبية حيث تبدي إتصالات فيما بينها أو مع خلايا أخرى كالخلايا العضلية، تدعى هذه الإتصالات بالمشابك.

لفهم كيف تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك المنبهة نقترح عليك الدراسة التالية:
تمثل الوثيقة التالية صور مجهرية للوحة المحركة.



1. أكمل بيانات الوثيقة وقدم عنوانا مناسباً لكل شكل.
2. إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومكتسباتك أكتب نصاً علمياً تشرح فيه آلية إنتقال وترجمة الرسالة العصبية على مستوى المشبك.

التمرين الثاني (7 نقاط):


يستعمل الأخصائيون في طب العيون قطرات مثل «الأترابين = l'atropine collyre» لدراسة العين عن طريق الفتح الكامل لحدقة العين وذلك رغم توفر ظروف إضاءة قوية. لمعرفة كيف يتم ذلك نقترح عليك الدراسة التالية.

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة (1) منعكس حدقة العين في ظروف إضاءة مختلفة حيث:

الشكل أ (يمثل حالة حدقة العين في الحالة الطبيعية (في الإضاءة وفي الظلام).

الشكل ب (يمثل حالة حدقة العين عند معالجتها بمادة «l'atropine collyre».



1. حل الوثيقة (1) مبرزا المشكلة العلمية حول تأثير مادة «l'atropine collyre».
2. إقترح فرضية لحل هذه المشكلة.

الجزء الثاني:


لإظهار آلية تأثير مادة «l'atropine collyre» نترح عليك الدراسة الممثلة في الوثيقة (2).

- الشكل (أ) يمثل آلية عمل المشبك العصبي العضلي على مستوى العضلات الملساء لحدقة العين.
- الشكل (ب) يمثل تأثير الأسيتيل كولين ومادة «l'atropine collyre» على عضلة ملساء لحدقة عين فأر.

~ عند 0 حقن العضلة مسترخية.

~ عند 1 حقن الأسيتيل كولين.

~ عند 2 حقن الأسيتيل كولين ومادة «l'atropine collyre».




1. حل منحي الشكل (ب) من الوثيقة (2).
2. انطلاقا من دراستك للوثائق السابقة بورر سبب إستعمال مادة «l'atropine collyre» من طرف أخصائي طب العيون مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.

التمرين الثالث (8 نقاط):

لمعرفة بعض آليات التنظيم الهرموني على مستوى العضوية نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تمت معايرة التحلون وتركيز الأنسولين في دم ثلاث أشخاص كانوا في حالة صوم (أي قبل تناول وجبات غذائية) بعد إحداث إفراط سكري تجريبي عن طريق الحقن. النتائج المتحصل عليها موضحة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (1).




1. حلل منحنيات الشكل (أ) تحليلًا مقارنًا .

2. إعتمادا على نتائج الشكل (ب) من الوثيقة (1) حدد الخلل الوظيفي عند الشخص (3)، ثم إقتراح فرضيتين تفسر الخلل عند الشخص (2).

الجزء الثاني:

لمعرفة سبب مرض الشخص (2) قمنا بمحضن خلايا كبدية لكل من الشخصين (1) و (2) في وسط يحتوي على أنسولين مشع ثم تتبعنا الإشعاع، النتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة (2)



1. بإستغلالك للوثيقة (2) صادق على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين.

2. إقتراح حلولاً للتصدي للاضطراب عند كل من الشخصين المصابين (2 و 3).

الجزء الثالث:

- بالإعتماد على المعلومات التي توصلت إليها في هذه الدراسة و معارفك ، أنجز مخططاً تحصيلياً لحلقة تنظيم الإفراط السكري.

الإجابة النموذجية

التمرين الأول (5 نقاط):

العلامة كاملة	العلامة مجزئة	الجواب	رقم الجواب
1.75	5*0.25 2*0.25	إكمال البيانات: 1. هيولى الخلية قبل المشبكية (العصبون) 2. حويصلات مشبكية 3. الشق المشبكي 4. هيولى خلية بعد مشبكية (العضلة) 5. تحرير محتوى الحويصلات في الشق المشبكي (الأستيل كولين) عنوان مناسب: الشكل (أ): صورة مجهرية لمشبك عصبي عضلي (لوحة محركة) في حالة راحة. الشكل (ب): صورة مجهرية لمشبك عصبي عضلي (لوحة محركة) في حالة نشاط.	-1-
3.25	0.5 0.25 8*0.25 0.5	النص العلمي: ← يتم إنتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك بإستعمال المبلغات العصبية الكيميائية، والتي تتمثل في مواد كيميائية تفرزها النهايات العصبية القبل المشبكية وتؤدي إلى زوال إستقطاب غشاء البعد المشبكي، فمماهي آلية إنتقال وترجمة الرسالة العصبية عبر المشبك؟ ← إثر إحداث تنبيه فعال تصل موجة زوال الإستقطاب إلى النهاية العصبية قبل مشبكية، حيث يكون التشفير على مستوى الغشاء قبل المشبكي بتواترات كمونات عمل، وهذا مايسبب إنتقال الحويصلات المشبكية والتحامها مع الغشاء قبل المشبكي، يتم بذلك طرح محتوى الحويصلات (الأستيل كولين) في الشق المشبكي ويتحول بذلك تشفير تلك الرسالة إلى تركيز المبلغ العصبي الكيميائي (بتركيز الأستيل كولين المفرز في الشق المشبكي)، يتثبت الأستيل كولين على المستقبلات الخاصة به على الغشاء بعد المشبكي، مما يتسبب في توليد رسالة عصبية بعد مشبكية، أي كمون بعد مشبكي تنبهي (PPSE) مؤديا الى تقلص العضلة. ← على مستوى المشبك، تتحول الرسالة العصبية المشفرة بتواترات كمونات العمل في العصبون قبل المشبكي، إلى رسالة مشفرة بتركيز الوسيط الكيميائي العصبي المفرز في الشق المشبكي.	-2-

التمرين الثاني (7 نقاط):

العلامة كاملة	العلامة مجزئة	الجواب	رقم الجواب	
2.5	0.25	تحليل الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) منعكس حدقة العين حيث نلاحظ:	-1-	الجزء الأول:
	3*0.25	في الشكل (أ): تحت تأثير الإضاءة تنقلص عضلات حدقة العين مما يؤدي إلى صغر قطر فتحة الحدقة، بينما في الظلام (غياب الإضاءة) فتكون عضلات حدقة العين مسترخية مما يؤدي إلى إتساع قطر فتحة الحدقة وهذا يدل على أن الإضاءة تعمل على تنبيه عضلات حدقة العين الحالة الطبيعية.		
	2*0.25	في الشكل (ب): تحت تأثير مادة «l'atropine collyre»: نلاحظ إتساع حدقة العين وعضلات الحدقة مسترخية رغم توفر الإضاءة وهذا يدل على أن مادة «l'atropine collyre» تعمل على فتح حدقة العين.		
	0.5	الإستنتاج: تعمل مادة «l'atropine collyre» على فتح حدقة العين بشكل كامل رغم توفر إضاءة قوية.		
	0.5	المشكلة العلمية: كيف تعمل مادة «l'atropine collyre» على فتح حدقة العين بشكل كامل رغم توفر شروط إضاءة قوية.		
0.5	0.5	الفرضية المقترحة: تحت تأثير مادة «l'atropine collyre» تكون عضلات حدقة العين مسترخية وهذا يكون نتيجة إلغاء منعكس حدقة العين (تعمل مادة «l'atropine collyre» على إيقاف منعكس حدقة العين ببقاء العضلات مسترخية رغم توفر إضاءة قوية).	-2-	
2.25	0.25	تحليل منحى الشكل (ب) من الوثيقة (2): يمثل المحنى شدة تقلص العضلة بدلالة الزمن في وجود مادة «l'atropine collyre» والأستيل كولين حيث نلاحظ:	-1-	الجزء الثاني:
	2*0.25	في زه (قبل حقن الأستيل كولين): تكون العضلة مسترخية وهذا يدل على غياب التنبيه.		
	2*0.25	في ز1 (عند حقن الأستيل كولين): تزداد شدة تقلص العضلة وتبقى متقلصة مدة تأثير الأستيل كولين وهذا يدل على تنبيه العضلة يتم بواسطة الأستيل كولين.		
	2*0.25	في ز2 (عند حقن الأستيل كولين ومادة «l'atropine collyre»): تناقص شدة تقلص العضلة وتصبح مسترخية مدة تأثير مادة «l'atropine collyre» وهذا يدل على إلغاء تنبيه الأستيل كولين للعضلة.		
	0.25	الإستنتاج: المشبك المتحكم في منعكس حدقة العين مشبك منبه يعمل بالأستيل كولين.		
	0.25	تعمل مادة «l'atropine collyre» على منع تنبيه عضلة حدقة العين فتبقى مسترخية.		

	-2-	تبرير سبب استعمال مادة «atropine collyre» من طرف أخصائي طب العيون: من الوثيقة (1): • نلاحظ أن عضلات حدقة العين تحت تأثير الإضاءة تتقلص مما يؤدي إلى صغر فتحة الحدقة. • عند استعمال مادة الأتروبين نلاحظ توسع حدقة العين وبقاء العضلات مسترخية. من الوثيقة (2): • نجد أن مادة الأتروبين تمنع تقلص عضلات حدقة العين بمنع وصول التنبيه إلى العضلات (عدم حدوث تنبيه رغم تواجد الأسيتيل كولين). • أن تقلص عضلات حدقة العين يتم عن طريق نقل الرسالة العصبية من العصبون إلى الخلية العضلية بواسطة مشبك منبه يعمل بالأسيتيل كولين حيث عند تحسس العين بالضوء تنبه العصبونات الحسية مما يؤدي إلى إفراز الأسيتيل كولين الذي ينبه العضلات فتقلص مما يؤدي إلى صغر فتحة حدقة العين. • من أجل فحص العين في ظروف إضاءة ملائمة يلجأ أخصائي طب العيون إلى استعمال مادة الأتروبين التي تمنع تقلص العضلات وبالتالي تبقى حدقة العين متسعة. • إن الفتح الكامل لحدقة العين يسمح بفحص العين من طرف الأطباء وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2*0.25	 1.75
--	-----	--	--	---

التمرين الثالث (8 نقاط):

الجزء الأول:	رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
	-1-	التحليل المقارن لمنحنيات الشكل (أ): يمثل الشكل (أ) منحنيات بيانية لتغيرات قيمة التحلون (غ/ل) بدلالة الزمن (سا) عند ثلاث أشخاص بعد إحداث إفراط سكري عن طريق الحقن. حيث نلاحظ: قبل حقن الغلوكوز: • قيمة التحلون عند الشخص (1) في القيمة المرجعية (العادية) تقدر بـ 1 غ/ل، بينما عند الشخصين (2) و (3) فتكون مرتفعة عن القيمة المرجعية (1.3 غ/ل و 2.3 غ/ل على التوالي). بعد حقن الغلوكوز: • بالنسبة للشخص (1): إرتفاع قيمة التحلون لتتجاوز القيمة المرجعية ثم تعود تدريجيا إلى القيمة المرجعية السابقة (1 غ/ل) وهذا يدل على تعديل الإفراط السكري عند هذا الشخص. • بالنسبة للشخص (2): إرتفاع قيمة التحلون لتتجاوز 2 غ/ل ثم تعود تدريجيا إلى القيمة السابقة المرتفعة (1.3 غ/ل) وهذا يدل على عدم تعديل الإفراط السكري عند هذا الشخص. • بالنسبة للشخص (3): إرتفاع قيمة التحلون لتبلغ 4 غ/ل ثم تنخفض قليلا لتبقى مرتفعة عند 3.5 غ/ل وهذا يدل على عدم تعديل الإفراط السكري عند هذا الشخص. الاستنتاج: الشخص (1) سليم، بينما الشخصين (2) و (3) يعانون من إفراط سكري.	0.25 3*0.25 2*0.25 2*0.25 2*0.25 0.5	 3
	-2-	تحديد الخلل الوظيفي عند الشخص (3) بالإعتماد على نتائج الشكل (ب): من خلال نتائج الشكل (ب) نلاحظ أن تركيز الأنسولين المفرز منخفض جدا عند الشخص (3) ومنه نستنتج أن الخلل الوظيفي عند الشخص (3) هو توقف إفراز الأنسولين. إقتراح فرضيتين تفسر الخلل عند الشخص (2): يتم إختيار فرضيتين من بين هذه الفرضيات. • سبب الخلل يعود لكون الأنسولين المفرز غير وظيفي (خلل في بنيته الفراغية). • سبب الخلل يعود إلى نقص المستقبلات الغشائية للأنسولين. • سبب الخلل يعود إلى غياب المستقبلات الغشائية للأنسولين. • سبب الخلل يعود لكون المستقبلات الغشائية للأنسولين غير طبيعية.	2*0.25 2*0.25	0.5 0.5

