

تمارين حول حركة الكواكب والاقمار الصناعية

التمرين 1: بكالوريا علوم تجريبية 2009

يدور قمر اصطناعي كتلته (m_s) حول الأرض في مسار دائري على ارتفاع (h) من سطحها. نعتبر الأرض كرة نصف قطرها (R)، وننمذج القمر الاصطناعي بنقطة مادية. تدرس حركة القمر الاصطناعي في المعلم المركزي الأرضي الذي نعتبره غاليليا.

- 1 - ما المقصود بالمعلم المركزي الأرضي؟
- 2 - اكتب عبارة القانون الثالث لكيبلر بالنسبة لهذا القمر.
- 3 - أوجد العبارة الحرفية بين مربع سرعة القمر (v^2) و (G) ثابت الجذب العام، M_T كتلة الأرض، h و R .
- 4 - عرّف القمر الجيومستقر واحسب ارتفاعه (h) وسرعته (v).
- 5 - احسب قوة جذب الأرض لهذا القمر. اشرح لماذا لا يسقط على الأرض رغم ذلك.

المعطيات: دور حركة الأرض حول محورها: $T = 24h$.

$$R = 6400 \text{ km} ; m_s = 2 \times 10^3 \text{ kg} ; M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg} ; G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2.\text{kg}^{-2}$$

التمرين 2: بكالوريا رياضيات 2009

ينتمي القمر الاصطناعي (Giove-A) إلى برنامج غاليليو الأوروبي لتحديد الموقع المكمل للبرنامج الأمريكي GPS. نعتبر القمر الاصطناعي (Giove-A) ذي الكتلة $m = 700 \text{ kg}$ نقطيا ونفترض أنه يخضع إلى قوة جذب الأرض فقط.

يدور القمر (Giove-A) بسرعة ثابتة في مدار دائري مركزه (O) على ارتفاع $h = 23,6 \times 10^3 \text{ km}$ من سطح الأرض.

- 1 - في أي مرجع تتم دراسة حركة هذا القمر الاصطناعي؟ وما هي الفرضية المتعلقة بهذا المرجع والتي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن؟
- 2 - أوجد عبارة تسارع القمر (Giove-A) وعين قيمته.
- 3 - احسب سرعة القمر (Giove-A) على مداره.
- 4 - عرّف الدور T ثم عين قيمته بالنسبة للقمر (Giove-A).
- 5 - احسب الطاقة الإجمالية للجسملة ((Giove-A)+أرض).

المعطيات: ثابت الجذب العام $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$ كتلة الأرض $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$

نصف قطر الأرض $R_T = 6,38 \times 10^3 \text{ km}$

التمرين 3: بكالوريا رياضيات 2012

يتصور العلماء في الرحلات المستقبلية نحو كوكب المريخ M وضع محطة لأجهزة الاتصالات مع الأرض على أحد أقمار هذا الكوكب، مثلا على القمر (P) Phobos.

المعطيات:

ثابت التجاذب الكوني: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$


المسافة بين المريخ M والقمر P : $r = 9,38 \times 10^3 \text{ km}$

كتلة المريخ: $m_M = 6,44 \times 10^{23} \text{ kg}$

كتلة القمر Phobos: m_P

دور المريخ حول نفسه: $T_M = 24 \text{ h } 37 \text{ min } 22 \text{ s}$

نفرض أن هذه الأجسام كروية الشكل وكتلتها موزعة بانتظام على حجومها وأن حركة هذا القمر دائرية وتنسب إلى مرجع غاليلي مبدؤه O مركز كوكب المريخ .




- 1 - مثل على الشكل القوة التي يطبقها الكوكب M على القمر Phobos (P).
- 2 - أ - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن حركة مركز عطالة هذا القمر دائرية منتظمة.
ب - استنتج عبارة سرعة دوران القمر P حول المريخ.
- 3 - جد عبارة دور حركة القمر T_P حول المريخ بدلالة المقادير r ، G ، m_M .
- 4 - اذكر نص القانون الثالث لكبلر وبين أن النسبة: $\frac{T_P^2}{r^3} = 9,21 \times 10^{-13} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$ ، ثم استنتج قيمة T_P .
- 5 - أين يجب وضع محطة الاتصالات S لتكون مستقرة بالنسبة للمريخ؟ ما قيمة T_S دور المحطة في مدارها حينئذ؟

التمرين 4: بكالوريا رياضيات 2008

المعطيات :

كتلة الشمس	$M_S = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$
نصف قطر مدار زحل	$r = 7.8 \times 10^8 \text{ km}$
ثابت الجذب العام	$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ SI}$



يدور كوكب زحل حول الشمس على مسار نعتبره دائري مركزه ينطبق على مركز عطالة الشمس (O) بحركة منتظمة .

- 1- مثل القوة التي تطبقها الشمس على كوكب زحل ثم أعط عبارتها .
- 2- ندرس حركة كوكب زحل في المرجع المركزي الشمسي (الهيليومركزي) الذي نعتبره غاليليا.
أ - عرف المرجع المركزي الشمسي .
ب - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد عبارة التسارع a لحركة مركز عطالة كوكب زحل .
ج- أوجد العبارة الحرفية للسرعة المدارية v للكوكب في المرجع المختار بدلالة: M_S ، G و نصف قطر المدار r ثم احسب قيمتها .
3- أوجد عبارة الدور T لحركة هذا الكوكب حول الشمس بدلالة : نصف قطر المدار r والسرعة v ثم أحسب قيمته .

التمرين 5: بكالوريا رياضيات 2008


يدور قمر اصطناعي كتلته (m) حول الأرض بحركة منتظمة، فيرسم مساراً دائرياً نصف قطره (r) ومركزه هو نفسه مركز الأرض.

- 1 - مثل قوة جذب الأرض للقمر الاصطناعي واكتب عبارة قيمتها بدلالة M_T ، m ، G ، r حيث:
 M_T كتلة الأرض ، m كتلة القمر الاصطناعي ، G ثابت الجذب العام.
 r نصف قطر المسار (البعد بين مركز الأرض ومركز القمر الاصطناعي).
2 - باستعمال التحليل البعدي أوجد وحدة ثابت الجذب العام (G) في الجملة الدولية (SI).
3 - بين أن عبارة السرعة الخطية (v) للقمر الاصطناعي في المرجع المركزي الأرضي تعطى بـ: $v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{r}}$.
4 - اكتب عبارة (v) بدلالة r و T حيث T دور القمر الاصطناعي.
5 - اكتب عبارة دور القمر الاصطناعي حول الأرض بدلالة M_T ، G ، r .
6 - أ/ بين أن النسبة $\left(\frac{T^2}{r^3}\right)$ ثابتة لأي قمر يدور حول الأرض، ثم احسب قيمتها العددية في المعلم المركزي الأرضي مقدرة بوحدة الجملة الدولية (SI).

ب/ إذا كان نصف قطر مسار قمر اصطناعي يدور حول الأرض $r = 2,66 \times 10^4 \text{ km}$ ، احسب دور حركته.

المعطيات: ثابت الجذب العام : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$ كتلة الأرض : $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ ، $\pi^2 = 10$

التمرين 6: بكالوريا رياضيات 2013



نعتبر قمرا اصطناعيا (S) كتلته m_s يدور حول الأرض في جهة دورانها بسرعة ثابتة (الشكل).

1. مثل القوى الخارجية المؤثرة على القمر الاصطناعي (S).
2. ماهو المرجع المناسب لدراسة حركة القمر الاصطناعي (S) ؟ عرفه.
3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد العبارة الحرفية لسرعة القمر الاصطناعي بدلالة: ثابت الجذب العام G ، كتلة الأرض M_T ، نصف قطر الأرض R_T وارتفاع مركز عطالة القمر الاصطناعي عن سطح الأرض h ، ثم احسب قيمتها.
4. أ- جد عبارة دور القمر الاصطناعي بدلالة: R_T ، G ، h ، M_T ، ثم احسب قيمته.
ب- هل يمكن اعتبار هذا القمر جيو مستقر ؟ علل.
5. ذكر بالقانون الثالث لكبلر، ثم بين أن النسبة: $\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = k$ ، حيث k ثابت يطلب حسابه.
يعطى: $\pi^2 = 10$ ، $R_T = 6380 \text{ km}$ ، $h = 35800 \text{ km}$ ، $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$ ، $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ (SI)}$.

التمرين 7: بكالوريا علوم تجريبية 2011

- الأسات 1 (Alsat1) قمر اصطناعي جزائري متعدد الاستخدامات كتلته $m_L = 90 \text{ kg}$ ، أرسل إلى الفضاء بتاريخ 28 نوفمبر 2002، يدور حول الأرض وفق مسار إهليجي و دوره $T = 98 \text{ min}$.
- 1- من أجل دراسة حركته نختار مرجعا مناسباً.
ب- اقترح مرجعا لدراسة حركة هذا القمر الاصطناعي حول الأرض .
ت- ذكر بنص القانون الثاني لكبلر .
 - 2- بفرض أن القمر الاصطناعي (Alsat1) يدور حول الأرض وفق مسار دائري على ارتفاع h عن سطحها
أ- مثل قوة جذب الأرض بالنسبة للقمر الاصطناعي.
ب- اكتب العبارة الحرفية لشدة قوة جذب القمر الاصطناعي بدلالة: M_T ، m_L ، h ، G ، R_T .
ج- بتطبيق قانون نيوتن الثاني تحقق أن عبارة سرعة القمر الاصطناعي المدارية هي الشكل: $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$ حيث $r = R_T + h$
د- عرف الدور T وأكتب عبارته بدلالة M_T ، r ، G .
هـ- احسب الارتفاع h الذي يتواجد عليه القمر (Alsat1) عن سطح الأرض .
معطيات: $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ SI}$ ، $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$ ، $R_T = 6.38 \times 10^3 \text{ km}$.

التمرين 8: بكالوريا علوم 2014

- في مرجع جيومركزي نعتبر الاقمار دائرية حول مركز الأرض التي نفترض أنها متجانسة كتلتها M_T ونصف قطرها R نقبل أن القمر الاصطناعي في مداره يخضع لقوة جذب الأرض $\vec{F}_{T/s}$ فقط .
- 1- أ- عرف المرجع الجيومركزي .
ب - اكتب العبارة الشعاعية للقوة $\vec{F}_{T/s}$ بدلالة G ، M_T ، R ، m_s كتلة القمر الاصطناعي و h ارتفاعه عن سطح الأرض .

ج - استنتج عبارة $\vec{a}$ شعاع تسارع حركة القمر الاصطناعي، ما طبيعة الحركة ؟

2- الجدول التالي يعطي بعض خصائص حركة قمرين اصطناعين حول الأرض .

أ- أحد القمرين جيومستقر عينه مع التعليل؟

القمر الاصطناعي	Alsat1	Astra
$T(s) \times 10^3$	5,964	86,160
$h(m) \times 10^6$	0,70	35,65

ب- احسب تسارع الجاذبية الأرضية g عند نقطة من مدار القمر الاصطناعي ألسات 1 ، ماذا تستنتج؟

ج - بين اعتمادا على معطيات الجدول أن قانون كبلر الثالث محقق .

د - استنتج قيمة تقريبية لكثافة الأرض.

3- لماذا دور الأرض حول نفسها ليس $24h$ ؟ (سؤال اضافي)

المعطيات: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ ، $R = 6380 \text{ km}$ ، $1 \text{ jour} = 23h 56 \text{ min}$

تسارع الجاذبية عند سطح الأرض: $g_0 = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

التمرين 9: بكالوريا رياضيات 2011

يدور كوكب القمر حول الأرض وفق مسار نعتبره دائريا مركزه هو مركز الأرض، ونصف قطره $r = 384 \times 10^3 \text{ km}$ ، ودوره $T_L = 25,5 \text{ j}$.

1 - أ - ما هو المرجع الذي تنسب إليه حركة كوكب القمر؟

ب - احسب قيمة السرعة v لحركة مركز عطالة القمر.

2 - المركبة الفضائية Apollo التي حملت رواد الفضاء إلى سطح القمر سنة 1968، حلقت في مدار دائري حول القمر على ارتفاع ثابت

$h_A = 110 \text{ km}$.

أ - ذكر بنص القانون الثالث لكبلر.

ب - أوجد عبارة دور المركبة T_A بدلالة h_A ونصف قطر القمر R_L وكتلته M_L ، وثابت الجذب العام G . احسب قيمته العددية.

3 - استنتج مما تقدم نصف القطر r_S للمدار الجيومستقر لقمر اصطناعي أرضي.

المعطيات: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ ، كتلة القمر : $M_L = 7,34 \times 10^{22} \text{ kg}$

نصف قطر القمر : $R_L = 1,74 \times 10^3 \text{ km}$ ، النسبة $\frac{M_T}{M_L} = 81,3$ حيث M_T كتلة الأرض.

4 - يوجد تشابه واضح بين النظامين الكوكبي والذري، إلا أنه لا يمكن تطبيق قوانين نيوتن على النظام الذري. بين محدودية قوانين نيوتن.

التمرين 10: بكالوريا رياضيات 2012

يدور قمر اصطناعي (S) حول الأرض بحركة دائرية منتظمة على ارتفاع $h = 700 \text{ km}$ من سطحها، حيث ينجز 14.55 دورة في اليوم

الواحد، نفرض أن المرجع المركزي الأرضي مرجع غاليلي.

1. مثل شعاع التسارع $\vec{a}$ لحركة القمر الاصطناعي (S) .

2. أعط دون برهان عبارة شعاع التسارع $\vec{a}$ لحركة القمر الاصطناعي (S) بدلالة v سرعة القمر

ونصف قطر المسار r وشعاع الوحدة $\vec{n}$.

3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن عبارة سرعة القمر الاصطناعي حول الأرض تعطى بالعلاقة:


$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$$

4. اكتب العلاقة بين T_S و r ، حيث T_S دور القمر الاصطناعي (S) حول الأرض.


5. بين أن $\frac{T_S}{r^3} = 9.85 \times 10^{-14} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$

6. استنتج M_T كتلة الأرض.

يعطى: $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ (SI)}$ ، $R_T = 6400 \text{ km}$.



التمرين 11: بكالوريا 2015 علوم



للتبسيط نعتبر مسارات حركة الكواكب السيارة حول الشمس في المرجع الهليومركزي بدوائر مركزها O وأنصاف أقطارها r حيث نرمز لكتلة الشمس بالرمز M_S .

1- أعد رسم الشكل ومثل عليه شعاع اللقوة الجاذبة المركزية $\vec{F}_{S/p}$ المطبقة من طرف الشمس على احد

الكواكب الذي كتلته m_p في مركز عطالته المتواجد في الموضع A .

2- عبر عن شعاع القوة $\vec{F}_{S/p}$ بدلالة G ثابت الجذب الكوني، M_S ، m_p ، r و $\vec{u}$ شعاع الوحدة.

3- بإهمال تأثير القوى الأخرى أمام $\vec{F}_{S/p}$ وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد عبارة تسارع حركة الكوكب في الموضع A بدلالة G ،

r و M_S .

4- استنتج طبيعة حركته حول الشمس.

5- يمثل الشكل تطور مربع الدور الزمني لكل من كوكب الأرض والمريخ وزحل بدلالة

مكعب نصف قطر مدار كل كوكب.

أ- هل يتوافق البيان مع قانون كبلر الثالث؟


ب- باستعمال البيان بين أن: $\frac{T^2}{r^3} = 3 \times 10^{-19} (SI)$ ثم استنتج قيمة كتلة الشمس M_S

$$G = 6.67 \times 10^{-11} SI$$

التمرين 12: بكالوريا 2016 رياضيات

1- يمثل الشكل المقابل مسار حركة أحد كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس، يستغرق الكوكب P نفس المدة الزمنية Δt في قطع

المسافتين $M_1M'_1$ و $M_2M'_2$. اذكر نصي قانوني كبلر الذين يمكن استخلاصهما



2- لتبسيط الدراسة نعتبر مسارات الكواكب دائرية نصف قطرها r بحيث تقع الشمس

في مركزها. يعطي الجدول الآتي مميزات حركة بعض هذه الكواكب:

الكوكب	نصف قطر المسار $r \times 10^6 Km$	الدور T	$\frac{T^2}{r^3} (s^2 \cdot m^{-3})$
الزهرة	108,2	224j 16h	
الأرض	149,6	365j 6h	
زحل	227,9	686j 22h	

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الكوكب P في المعلم الهليومركزي، جد عبارة سرعة الكوكب بدلالة ثابت الجذب العام

G ، كتلة الشمس M_S و نصف القطر r لمسار الكوكب P .

ب- اكتب عبارة الدور T للكوكب بدلالة G ، M_S و r ، ثم استنتج عبارة القانون الثالث لكبلر.

ج- اكمل الجدول السابق، ماذا تستنتج؟

د- احسب كتلة الشمس M_S .

هـ- تتميز حركة المشتري حول الشمس بالدور $T = 314j 11h$ ، اوجد البعد r لمركز المشتري عن مركز الشمس.

$$G = 6.67 \times 10^{-11} SI$$

التمرين 13: بكالوريا علوم تجريبية 2010

أ/ يكون مسار حركة مركز عطالة كوكب حول الشمس اهليلجيا كما يوضحه الشكل -

4. ينتقل الكوكب أثناء حركته على مداره من النقطة C إلى النقطة C' ثم من النقطة D إلى النقطة D' خلال نفس المدة الزمنية Δt .

1 - اعتمادا على قانون كبلر الأول فسر وجود موقع الشمس في النقطة F_1 ، كيف نسمي عندئذ النقطتين F_1 و F_2 .

2 - حسب قانون كبلر الثاني ما هي العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2 ؟

3 - بين أن متوسط السرعة بين الموضعين C و C' أقل من متوسط السرعة بين الموضعين D و D'.

ب/ من أجل التبسيط نمذج المسار الحقيقي لكوكب في المرجع الهليومركزي بمدار دائري مركزه O (مركز الشمس) ونصف قطره r الشكل 5- يخضع كوكب أثناء حركته حول الشمس إلى تأثيرها والذي

ينمذج بقوة $\vec{F}$ ، قيمتها تعطى حسب قانون الجذب العام لنيوتن بالعلاقة: $F = G \frac{mM}{r^2}$ حيث M كتلة الشمس، m كتلة الكوكب و G ثابت التجاذب الكوني $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$ باستعمال برمجة

« satellite » في جهاز الإعلام الآلي تم رسم

البيان $T^2 = f(r^3)$ الشكل 6. حيث T دور الحركة.

1 - اذكر نص قانون كبلر الثالث.

2 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكوكب وبإهمال تأثيرات الكواكب

الأخرى، أوجد عبارة كل من v سرعة الكوكب ودور حركته T بدلالة r ، G ، M ،

3 - أوجد بيانيا العلاقة بين T^2 و r^3 .

4 - أوجد العلاقة النظرية بين T^2 و r^3

5 - بتوظيف العلاقتين الأخيرتين استنتج قيمة كتلة الشمس M.

التمرين 14:

تم ارسال اول قمر صناعي Galiléo للبرنامج GIOVEA في 28 ديسمبر 2005 . نعتبر ان القمر الاصطناعي جسما نقطيا S يخضع لقوة جذب الارض فقط، يرسم مدارا دائريا على ارتفاع $h = 23,6 \cdot 10^3 \text{ km}$ عن سطح الارض.

1- مثل كيفيا الارضة القمر الاصطناعي على مساره والقوة المطبقة من طرف الارض على هاذ القمر .

2- ما هو المرجع الذي تدرس فيه الحركة؟ ما هي الفرضية الواجب وضعها بالنسبة لهذا المرجع ليصبح عطاليا؟

3- اوجد عبارة سرعة الحركة بدلالة M_T ، R_T ، h و G.

4- اجد عبارة دور القمر ثم استنتج قانون كبلر الثالث.

5- مقارنة حركة القمر الصناعي بحركة اقمار صناعية اخرى: الجدول التالي يعطى دور و نصف قطر مدارات بعض الاقمار الصناعية:

القمر	$h(\text{km})$	$T(\text{s})$	$r^3(\text{m}^3)$	$T^2(\text{s}^2)$
GPS	$13,9 \times 10^3$	$2,88 \times 10^4$		
GLONASS	$19,1 \times 10^3$	$4,02 \times 10^4$		
METEOSAT	$35,7 \times 10^3$	$8,61 \times 10^4$		

أ/ اكمل الجدول ثم ارسم البيان: $T^2 = f(r^3)$ باستعمال سلم مناسب.

ب/ اكتب معادلة المنحنى الناتج و تأكد ان البيان يتوافق مع قانون كيبلر الثالث.

ج/ استنتج كتلة الأرض R_T .

د/ باستعمال البيان اوجد دور القمر الصناعي Galileo، ثم احسب سرعته وتسارعه.

$$G = 6,67 \times 10^{-11} SI, \quad R_T = 6400 Km$$

التمرين 15: بكالوريا رياضيات 2014 بتصرف

بتاريخ 12 جويلية 2010 تم إطلاق القمر الاصطناعي الجزائري الثاني Alsat 2 الذي نرسم له بـ (S) حيث تم وضعه في مداره الإهليلجي بنجاح، ليدور حول الأرض على ارتفاع من سطحها محصور بين 600km و 1000km.

1. يمثل الشكل رسما تخطيطيا مبسطا لمدار (S) حول الأرض، نعتبر (S) خاضعا لقوة جذب الأرض فقط.

يعطى: نصف قطر الأرض $R_T = 6400 km$ وكتلتها $M_T = 6 \times 10^{24} kg$ ودور حركتها حول محورها $T_T = 24h$.

أ- ماذا يمثل مركز الأرض بالنسبة لمدار هذا القمر الاصطناعي؟

ب- مثل في موضع كيفي من المدار شعاع القوة التي يخضع لها (S) أثناء دورانه حول الأرض.

ج- احسب دور هذا القمر. علما أن $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$.

2. نعتبر حركة (S) دائرية على ارتفاع متوسط ثابت $h = 800 km$.

أ- هل شدة قوة جذب الأرض لـ (S) ثابتة؟ علل.

ب- احسب شدة هذه القوة علما أن كتلة هذا القمر هي $m = 130 kg$.


3. أ- أذكر خصائص القمر الاصطناعي الجيومستقر.

ب- هل يمكن اعتبار (S) قمرا اصطناعيا جيومستقر؟ لماذا؟

ج- احسب قيمة سرعة القمر الاصطناعي (S).

4. يمكن لقمر اصطناعي آخر نعتبره جيومستقر أن يدور حول الأرض بحركة دائرية منتظمة على ارتفاع Z من سطحها.


- جد الارتفاع Z للقمر الاصطناعي الجيومستقر.



تمارين حول السقوط الشاقولي والحر للأجسام

التمرين 16: بكالوريا علوم 2012

ندرس في مرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا حركة سقوط كرية في الهواء. الشكل يمثل تطور سرعة مركز عطالة الكرية v بدلالة الزمن t



1 - من البيان:

أ - حدّد المجال الزمني لنظامي الحركة.

ب - عيّن قيمة السرعة الحدية v_{ℓ} .

ج - احسب تسارع مركز عطالة الكرية في اللحظة $t = 0$. ماذا تستنتج؟

د - ما هي قيمة التسارع لحظة وصول الكرية إلى الأرض؟


هـ - كم تكون قيمة الطاقة الحركية للكزية في اللحظة $t = 3s$ ؟

2 - مثلّ كيفيا مخطط السرعة $v(t)$ لحركة السقوط الشاقولي لمركز عطالة الكرية في الفراغ.

المعطيات: $g = 9,80 \text{ m.s}^{-2}$ ، كتلة الكرية : $m = 30 \text{ g}$.

التمرين 17: بكالوريا علوم تجريبية 2010

تمت معالجة السقوط الشاقولي لجسم صلب (S) في الهواء بجهاز الإعلام الآلي، وذلك بعد تصويره بكاميرا رقمية فتحصلنا على البيان $v =$



$f(t)$ الذي يمثل تغيرات سرعة مركز عطالة الجسم بدلالة الزمن .

1 - حدد طبيعة مركز عطالة الجسم (S) في النظامين الانتقالي والدائم. علل.

2 - بالاعتماد على البيان عيّن:

أ - السرعة الحدية $v_{\lim}$.

ب - تسارع الحركة في اللحظة $t=0$.

3 - كيف يكون الجسم الصلب (S) متميزا وهذا للحصول على حركة مستقيمة

شاقولية انسحابية في نظامين انتقالي ودائم؟

4 - باعتبار دافعة أرخميدس مهمة، مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) أثناء

السقوط، واستنتج عندئذ المعادلة التفاضلية للحركة بدلالة السرعة v في حالة السرعات الصغيرة.

5 - توقع شكل مخطط السرعة عند إهمال دافعة أرخميدس ومقاومة الهواء. علل.

التمرين 18: بكالوريا رياضيات 2015

تترك كرية كتلتها m تسقط في الهواء من ارتفاع h عن سطح الأرض دون سرعة ابتدائية .

تعطى: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1- نهمل دافعة أرخميدس ونعتبر شدة قوة مقاومة الهواء $f = k \cdot v^2$.

أ - مثل القوى الخارجية المؤثرة على الكرية .

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم Oz موجه نحو الأسفل ومرتببط بمرجع

سطحي أرضي نعتبره غاليليا ، أوجد المعادلة التفاضلية لسرعة الكرية.

ج - استنتج عبارة السرعة الحدية $v_{\lim}$ بدلالة k ، m و g .

2- ان دراسة تغيرات سرعة الكرية بدلالة الزمن مكنت من الحصول على بيان الشكل المقابل.

أ- استنتج من البيان قيمة السرعة الحدية v_{lim} .

ب- حدد وحدة الثابت k باستعمل التحليل البعدي ، احسب النسبة $\frac{m}{k}$.

3- كيف يتطور تسارع الكرة خلال الزمن ؟

4- مثل كيفيا مخطط السرعة $v(t)$ لحركة مركز عطالة الكرة في الفراغ.

التمرين 19: بكالوريا علوم تجريبية 2013

تسقط حبة برد كروية الشكل قطرها : $D = 3\text{cm}$ كتلتها $m = 13\text{g}$ دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$ من النقطة O ترتفع بـ 1500m عن سطح الارض نعتبرها كمبدأ للمحور الشاقولي (oz) .

أولاً: نفترض أن حبة البرد تسقط سقوطاً حراً.

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، جد المعادلتين الزمنية لسرعة وموضع G مركز عطالتها.

2- احسب قيمة السرعة لحظة وصولها الى سطح الارض.

ثانياً: في الواقع تخضع حبة البرد بالإضافة لتقلها $\vec{P}$ الى قوة دافعة أرخميدس $\vec{\pi}$ وقوة احتكاك $\vec{f}$ المتناسبة طرداً مع مربع السرعة حيث $f = kv^2$.

1- بالتحليل البعدي حدد وحدة المعامل k في النظام الدولي للوحدات .

2- اكتب عبارة قوة دافعة أرخميدس ، ثم احسب شدتها وقارنها مع شدة قوة الثقل . ماذا تستنتج؟

3- باهمال دافعة أرخميدس $\vec{\pi}$:

أ- جد المعادلة التفاضلية للحركة ، ثم بين أنه يمكن كتابتها على الشكل

$$\frac{dv}{dt} = A - Bv^2$$

ب- استنتج العبارة الحرفية للسرعة الحدية v_l التي تبلغها حبة البرد.

ج- جد بياناً قيمة v_l السرعة الحدية ثم استنتج قيمة k .

د- قارن بين سرعتين التي تم حسابهما في السؤالين (أولاً 2-)

و (ثانياً 3- ج) . ماذا تستنتج ؟

المعطيات: حجم الكرة: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ، الكتلة الحجمية للهواء: $\rho = 1,3\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ، $g = 9,8\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

التمرين 20 : بكالوريا علوم تجريبية 2009

يسقط مظلي كتلته مع تجهيزه $m = 100\text{kg}$ سقوطاً شاقولياً بدءاً من نقطة O بالنسبة لمعلم أرضي دون سرعة ابتدائية. يخضع أثناء سقوطه

إلى قوة مقاومة الهواء عبارتها من الشكل $f = kv$ (تهمل دافعة أرخميدس). يمثل البيان الشكل

تغيرات (a) تسارع مركز عطالة المظلي بدلالة السرعة (v).

1 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية لحركة المظلي من الشكل :

$$\frac{dv}{dt} = Av + B$$

2 - عيّن بياناً قيمتي كل من:

أ - شدة مجال الجاذبية الأرضية (g).

ب - السرعة الحدية للمظلي (v_l).

3 - تتميز الحركة السابقة بالمقدار $\frac{k}{m}$. حدد وحدته واحسب قيمته من البيان.

4 - احسب قيمة الثابت k .

5 - مثل كيفيا تغيرات سرعة المظلي بدلالة الزمن في المجال الزمني : $0 \leq t \leq 7s$.

التمرين 21: بكالوريا رياضيات 2010

لدراسة حركة سقوط جسم صلب (S) كتلته m شاقوليا في الهواء، استعملت كاميرا رقمية (Webcam)، عولج شريط الفيديو ببرمجية (Avistep) في جهاز الإعلام الآلي فتحصلنا على النتائج التالية:

$t(ms)$	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
$v(m.s^{-1})$	0	0,60	0,90	1,02	1,08	1,10	1,12	1,13	1,14	1,14

1 - أ - ارسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات السرعة v بدلالة الزمن t : $v = f(t)$.

السلم: $1 cm \rightarrow 0,1 s$. $1 cm \rightarrow 0,20 m.s^{-1}$

ب - عين قيمة السرعة الحدية v_{lim} .

ج - كيف كون الجسم الصلب (S) متميزا للحصول على حركة مستقيمة شاقولية انسحابية في نظامين انتقالي ودائم؟

د - احسب تسارع حركة (S) في اللحظة $t=0s$.

2 - تعطى المعادلة التفاضلية لحركة (S) بالعلاقة $\frac{dv}{dt} + Av = C \left(1 - \frac{\rho V}{m}\right)$.

حيث ρ الكتلة الحجمية للهواء، V حجم الجسم (S).

أ - مثل القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة (S).

ب - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد المعادلة التفاضلية لحركة مركز عطالة (S) بدلالة السرعة v وذلك في حالة السرعات الصغيرة.

وبيّن أن: $A = \frac{k}{m}$ و $C = g$ حيث k ثابت يتعلق بقوى الاحتكاك.

ج - استنتج قيمة دافعة أرخميدس وقيمة الثابت k .
تعطى: $g = 10 N.Kg^{-1}$ ؛ $m = 19g$.

التمرين 22 : بكالوريا علوم 2011

تسقط كرية مطاطية شاقوليا في الهواء دون سرعة ابتدائية $v_0 = 0 m.s^{-1}$ وننمذج السقوط بطريقة رقمية.

المعطيات: كتلة الكرية $m=3g$ ؛ نصف قطرها $r=1,5cm$ ؛ الكتلة الحجمية للهواء $\rho_{air}=1,3kg.m^{-3}$.

حجم الكرة $V=(4/3).\pi r^3$ ؛ قوة الاحتكاك $f=kv^2$ ؛ $g=9,8 m.s^{-2}$.

1 - مثل القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الكرية خلال مراحل السقوط.

2 - باختيار مرجع غاليلي مناسب وبتطبيق قانون نيوتن الثاني اكتب المعادلة

التفاضلية للسرعة.


3 - بالمعالجة الرقمية حصلنا على البيانيين : $a = h(t)$ و $v = f(t)$

أ - أي المنحنيين يمثل تطور التسارع $a(t)$ بدلالة الزمن؟ علل.

ب - حدّد بيانيا السرعة الحدية v_ℓ .


ج - علما أن $v_\ell = \sqrt{\frac{g}{k}(m - \rho_{air}V)}$

- احسب قيمة معامل الاحتكاك k .



التمرين 23: بكالوريا رياضيات 2013

أثناء التدريبات التي تقوم بها فرقة الصاعقة للمظليين بالمدرسة العليا لقوات الخاصة ببسكرة ، استعملت طائرة عمودية حلقت على ارتفاع ثابت من سطح الأرض لانزال المظليين دون سرعة ابتدائية .



الشكل-4

- 1- نمذج المظلي ومظلته بجملة (S) مركز عطالتها G وكتلتها : $m = 80kg$ ، نهمل تأثير دافعة ارخميدس. يقفز المظلي دون سرعة ابتدائية ، فيقطع ارتفاعا h خلال $8s$ قبل فتح مظلته . نعتبر حركة سقوطه حرا. ان دراسة تطور $v(t)$ سرعة المظلي بدلالة الزمن في معلم شاقولي (ok) موجه نحو الاسفل مرتبط بمرجع سطحي ارضي ، مكنت من الحصول على البيان في الشكل 4- .
- أ- حدد طبيعة حركة الجملة (S) مع التعليل.
- ب- احسب الارتفاع h .

ج- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن استنتج تسارع الجاذبية الأرضية g .

- 2- بعد قطع المظلي الارتفاع h يفتح مظلته ، فتخضع الجملة لقوة احتكاك عبايتها $f = kv^2$.

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين ان المعادلة التفاضلية لسرعة الجملة (S) تكتب بالعلاقة: $\frac{dv}{dt} = g \left(1 - \frac{v^2}{\beta}\right)$ حيث β ثابت يطلب التعبير عنه بدلالة : k ، g و m .

ب- يمثل المقدار β :

- سرعة الجملة (S) في اللحظة $t = 0$.
- تسارع حركة مركز عطالة الجملة في النظام الدائم.
- السرعة الحدية v_{lim} للجملة (S) .

اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات السابقة.

- 3- يمثل الشكل تغيرات سرعة مركز عطالة الجملة (S) بدءا من لحظة فتح المظلة التي نعتبرها مبدأ للأزمنة.

أ- حدد قيمة السرعة الحدية v_{lim} .

ب- بالاعتماد على التحليل البعدي حدد وحدة الثابت k ثم احسب قيمته .

$$g = 9.8 m/s^2 \text{ يعطى}$$

التمرين 24: بكالوريا علوم تجريبية 2008

هذا النص مأخوذ من مذكرات العلم هويغينز: في البداية كنت أظن قوة الاحتكاك في مائع تتناسب طردا مع السرعة ولكن التجارب التي حققتها في باريس بينت لي أن قوة الاحتكاك يمكن أن تتناسب طردا مع مربع السرعة . وهذا يعني أنه اذا تحرك متحرك بسرعة ضعف ما كانت عليه ، يصطدم بكمية من المائع تساوي مرتين ولها سرعة ضعف ما كانت عليه.....


- 1- يشير النص الى فرضيتي هويغينز حول الاحتكاك في الموائع، يعبر عنهما رياضيا بالعلاقين :

$$f = kv \dots \dots \dots (1) , f = k'v^2 \dots \dots \dots (2)$$

حيث f قيمة قوة الاحتكاك ، v سرعة مركز عطالة المتحرك ، k و k' ثابتان موجبان.

- ارفق بكل علاقة التعبير المناسب - من النص- عن كل فرضية.

2- للتأكد من صحة الفرضيتين، تم تسجيل حركة بالونة تسقط في الهواء . سمح التسجيل بالحصول على سحابة من النقاط تمثل تطور سرعة



مركز عطالة البالونة، في لحظات زمنية معينة.

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، واعتماد على الفرضية المعبر عنها بالعلاقة (1) ،

اكتب المعادلة التفاضلية لحركة سقوط البالونة بدلالة:

- ρ_0 الكتلة الحجمية للهواء . - ρ الكتلة الحجمية للبالونة . -

- m كتلة البالونة - g تسارع الجاذبية - k ثابت التناسب .

ب- بين أن المعادلة التفاضلية للحركة يمكن كتابتها على الشكل : $\frac{dv}{dt} + Bv = A$ حيث

A و B ثابتان .

ج- اعتمادا على البيان ، ناقش تطور السرعة v واستنتج قيمتها الحدية v_{lim} . ماذا يمكن القول عن حركة مركز عطالة البالونة عندئذ ؟

د- احسب قيمتي A و B .

3- رسم على نفس المخطط السابق المنحنى $v = f(t)$ وفق A و B حيث المنحنى ممثل بالخط المستمر . ناقش صحة الفرضية (1) .

$$g = 9,81 \text{ m.s}^{-2} , \rho = 4,1 \text{ kg.m}^{-3} , \rho_0 = 1,3 \text{ kg.m}^{-3}$$

التمرين 25:

منطاد مصنوع من المطاط الرقيق والجلد المرن ، تم نفخه بواسطة الهليوم . يحمل هذا المنطاد جهازا علميا لدراسة تركيب الغلاف الجوي.

يهدف هذا التمرين الى دراسة حركة المنطاد على ارتفاع منخفض ، حيث نعتبر ان تسارع الجاذبية الارضية g ، حجم المنطاد ولواحقه V_b والكتلة الحجمية للهواء ρ تبقى ثابتة. تعطى قوة الاحتكاك بالعلاقة $f = K\rho v^2$ حيث K ثابت . ندرس حركة المنطاد في معلم أرضي نعتبره عطاليا محوره موجه نحو الاعلى.

i. شرط اقلاع المنطاد : معطيات: $\rho = 1.23 \text{ kg/m}^3$ ، $V_b = 9 \text{ m}^3$ ، $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

1- ما هي القوى المؤثرة على المنطاد أثناء صعوده نحو الاعلى عين خصائصها ومثلها.


2- لتكن m كتلة المنطاد ولواحقه ، ونعتبر ان السرعة الابتدائية عند الاقلاع معدومة .

أ- ما هي الشروط التي يحققها شعاع التسارع حتى يتمكن المنطاد من الصعود؟

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن استنتج الشرط الذي تحققه الكتلة m حتى يتمكن المنطاد من الاقلاع .

ج- هل يقلع المنطاد اذا علمت ان كتلته مع لواحقه هي: $m = 4.1 \text{ kg}$ ؟

ii. صعود المنطاد: المنحنى البياني في الشكل المقابل يمثل تغيرات سرعة المنطاد ولواحقه بدلالة الزمن .



1- بين ان المعادلة التفاضلية لحركة المنطاد تكتب من الشكل: $\frac{dv}{dt} + Av^2 = B$ حيث

A و B ثابتان يطلب تعيين عبارتهما بدلالة: ρ ، V_b ، K و g .

2- ما هو المدلول الفيزيائي لـ B ثم احسب قيمته بطريقتين .

3- أعط العبارة الحرفية للسرعة الحدية v_l ثم عين قيمتها بيانيا .

4- بالتحليل البعدي أوجد وحدة الثابت K ثم احسب قيمته .

تمارين حول حركة القذائف

التمرين 26: بكالوريا رياضيات 2011

في لعبة رمي الجلة ، يقذف اللاعب في اللحظة $t = 0$ الجلة من ارتفاع $oz_0 = h = 2.0m$ من سطح الأرض ، بسرعة ابتدائية: $v_0 = 13.7 m/s$ ، شعاعها يصنع زاوية $\alpha = 35^\circ$. نهمل تأثير الهواء (مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس) ونأخذ $g = 9.8 m/s^2$.


1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على القذيفة في المعلم المبين على الشكل استخرج:

أ- المعادلات التفاضلية للحركة.

ب- المعادلات الزمنية للحركة.

2- اكتب معادلة المسار $z = f(t)$.

3- أوجد احداثيات M نقطة سقوط القذيفة . وما هي سرعتها عندئذ؟



التمرين 27: بكالوريا علوم تجريبية 2012

خلال منافسة رمي الجلة في الالعاب الاولمبية ببكين ، حقق الرياضي الذي فاز بهذه المنافسة

النتيجة $d = 21.51m$. اعتمادا على الفلم المسجل لعملية الرمي ولأجل معرفة قيمة

السرعة v_0 التي قذفت بها الجلة ، تم استخراج بعض المعطيات أثناء لحظة الرمي :

- قذفت الجلة من النقطة A الواقعة على ارتفاع $h_A = 2m$ بالنسبة لسطح الأرض

وبالسرعة $\vec{v}_0$ التي تصنع زاوية $\alpha = 45^\circ$ مع الخط الأفقي.

ندرس حركة الجلة في المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{k})$ ونختار اللحظة الابتدائية $t = 0$

هي اللحظة التي يتم فيها قذف الجلة من النقطة A . نهمل احتكاكات الجلة مع الهواء ودافعة

أرخميدس بالنسبة لقوة ثقل الجلة.

1- جد المعادلتين الزميتين $x = f(t)$ و $z = h(t)$ المميزتين لحركة الجلة في المعلم المختار.

- استنتج معادلة مسار الجلة $z = g(t)$ بدلالة المقادير h_A ، α ، g و v_0 .

2- جد عبارة السرعة الابتدائية v_0 بدلالة h_A ، α ، g و d ثم احسب قيمتها.

3- جد المدة الزمنية التي تستغرقها الجلة في الهواء.

التمرين 28: بكالوريا علوم تجريبية 2016

المعطيات: $v_0 = 10m/s$ ، $g = 10m/s^2$

بإحدى الحصص التدريبية لكرة القدم استقبل اللاعب كرة زميله فقفزها برأسه نحو المرمى بغية تسجيل هدف. غادرت الكرة رأسه في لحظة

نعتبرها $t = 0$ من النقطة B في اتجاه المرمى بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ واقعة على المستوي الشاقولي المتعامد مع مستوي المرمى ويصنع حاملها

زاوية $\alpha = 30^\circ$ مع الأفق. تقع النقطة B على الارتفاع $h_B = 2m$ من سطح


الأرض كما هو موضح بالشكل المقابل .

1- بإهمال أبعاد الكرة وتأثير الهواء عليها ، وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن على

الكرة في المعلم السطحي الأرضي (Ox, Oy) أوجد ما يلي:

أ- المعادلتين الزميتين $x(t)$ و $y(t)$.

ب- معادلة المسار $y = f(x)$.



ج- قيمة سرعة مركز عاطلة الكرة عند الذروة.

2- يبعد خط التهديد عن اللاعب بالمسافة $d = 10m$ وارتفاع المرمى $L = 2,44m$.


أ- اكتب الشرط الذي يجب ان يحققه كل من x و y لكي يسجل الهدف مباشرة إثر هذه الرمية الرأسية؟

ب- هل سجل اللاعب الهدف بهذه الراسية؟ برر جوابك .

التمرين 29: بكالوريا علوم تجريبية 2010

تؤخذ $g = 10m \times s^{-2}$ ، مقاومة الهواء ودافعة ارخميدس مهملتان.

لتنفيذ مخالفة خلال مباراة كرة القدم ، وضع اللاعب الكرة في النقطة O مكان وقوع الخطأ على بعد $d = 25m$ من خط المرمى ، حيث ارتفاع العارضة الافقية $h = AB = 2.44m$. يقذف اللاعب الكرة بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ يصنع حاملها مع الافق زاوية $\alpha = 30^\circ$.



1- ادرس طبيعة حركة الكرة في المعلم $(\vec{ox}, \vec{oy})$.

- بأخذ مبدأ الازمنة لحظة القذف استنتج معادلة المسار.


2- كم يجب أن تكون v_0 حتى يسجل الهدف مماسيا للعارضة الافقية (النقطة A) ؟

- ما هي المدة الزمنية المستغرقة؟ وما هي قيمة سرعتها عندئذ (النقطة A) ؟

3- كم يجب أن تكون v'_0 حتى يسجل الهدف مماسا لخط المرمى (النقطة B) ؟

التمرين 30: بكالوريا رياضيات 2015

ملعب التنس عبارة عن مستطيل طوله $23.8m$ وعرضه $8.23m$. وضعت في منتصفه شبكة ارتفاعها $0.92m$. عندما يرسل اللاعب الكرة يجب أن تسقط في منطقة محصورة بين الشبكة وخط يوجد على مسافة $6.4m$ من الشبكة كما هو موضح بالشكل.



في دورة رولان فاروس الدولية يريد اللاعب ندال اسقاط الكرة في النقطة B حيث

$OB = L = 18.7m$. يرسل اللاعب الكرة نحو الأعلى ثم يضربها بمضربه من

نقطة D توجد على ارتفاع $h = 2.2m$ من النقطة O. تتطلق الكرة من النقطة D

بسرعة أفقية $v_0 = 126km/h$ كما هو موضح بالشكل التالي.

نهمل تأثير الهواء ونأخذ $g = 9.8m/s^2$. نعتبر أن الحركة تتم في معلم سطحي

أرضي يعتبر غاليليا.

1- مثل القوى المؤثرة على الكرة خلال حركتها بين B و D .

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلتين الزمنيتين للحركة

$x(t)$ و $y(t)$.

3- استنتج معادلة المسار.

4- هل تمر الكرة فوق الشبكة؟ علما ان $OF = 12.2m$.


5- هل نجح نادال في الارسال؟

التمرين 31: بكالوريا رياضيات 2009

قام لاعب كرة السلة بتسديد الكرة نحو السلة من نقطة A منطبقة على مركز الكرة الموجودة على ارتفاع $h_0 = 2.10m$ من سطح الارض

بسرعة ابتدائية $v_0 = 8m/s$ يصنع حاملها زاوية 37° مع الافق . ليمر مركز الكرة G بمركز السلة C الذي احداثياته $(x_c = 4.5m, z_c)$

في المعلم الارضي $(\vec{ox}, \vec{oy})$ الذي نعتبره غاليليا.



1- ادرس حركة مركز عطالة الكرة في المعلم $(\overrightarrow{ox}, \overrightarrow{oy})$ معتبرا مبدأ الازمنة لحظة تسديد

الكرة واهمال تأثير الهواء.

2- احسب z_c .

3- يعبر مركز عطالة الكرة مركز السلة بسرعة $\vec{v}_c$ التي يصنع حاملها مع الافق زاوية β .

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

استنتج قيمتي β و v_c .

التمرين 32: بكالوريا رياضيات 2014:

أثناء دراسة تأثير القوى الخارجية على حركة جسم ، كلف الاستاذ تلميذين بمناقشة الحركة الناتجة عن رمي جلة ، فأجاب الاول أن حركة

الجلة لا تتأثر الا بتقلها ، بينما اجاب الثاني أن حركتها تتعلق بدافعة ارخميدس .

من أجل التصديق على الجواب الصحيح ، اعتمد التلميذان على دراسة الرمية التي حقق بها رياضي رقما قياسيا عالميا مداها 21.69 m .

عند محاولتهما محاكات هذه الرمية بواسطة برنامج خاص ، تم قذف الجلة التي نعتبرها جسما نقطيا من ارتفاع $h = 2.62 \text{ m}$ بسرعة ابتدائية

$v_0 = 13.7 \text{ m/s}$ يصنع شعاعها مع الافق زاوية $\alpha = 43^\circ$ فتحصلا على رسم لمسار مركز عطالة الجلة كما في الشكل 9- والمنحنيين

$v_x(t)$ و $v_y(t)$ كما في الشكل 10- .

i. دراسة نتائج المحاكات:

1- ما هي طبيعة حركة مركز عطالة الجلة على المحور ox ؟ برر اجابتك.

2- عين القيمة v_{0y} للمركبة الشاقولية لشعاع السرعة الابتدائية انطلاقا من

الشكل 10- ثم عين قيمة v_0 للسرعة الابتدائية للقذيفة ، وهل تتوافق مع

المعطيات السابقة : $v_0 = 13.7 \text{ m/s}$ و $\alpha = 43^\circ$.

3- عين خصائص شعاع السرعة $\vec{v}_s$ عند الذروة S .

ii. الدراسة التحليلية لحركة مركز عطالة الجلة:

المعطيات : الجلة عبارة على كرة حجمها V وكثلتها الحجمية $\rho = 7.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. الكتلة

الحجمية للهواء : $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$.

1- بين ان دافعة ارخميدس مهمة أمام ثقل الجلة . أي التلميذين على صواب؟

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد عبارة تسارع مركز عطالة الجلة . نهمل مقاومة الهواء.

3- جد معادلة المسار لمركز عطالة الجلة .

التمرين 33:

نقذف عند اللحظة $t = 0$ كرة كتلتها m ، بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ من نقطة O كما هو مبين على الشكل

المقابل. نعتبر أن حركة الجسم تتم في المستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$ وتدرس بالنسبة للمرجع الأرضي الذي نعتبر مرجعا غاليليا. نهمل كل من مقاومة


الهواء و دافعة أرخميدس.

يمثل البيان الموالي تغيرات قيمة سرعة القذيفة بدلالة الزمن بين الوضعين O و M .


1-مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم الصلب.

2-بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين طبيعة الحركة.

3-أوجد المعادلات الزمنية لكل من السرعة والموضع.



4 - أوجد من البيان :



- القيمة v_0 لشعاع السرعة $\vec{v}_0$.

- قيمة المركبة v_{0x} لشعاع السرعة $\vec{v}_0$.


5 - استنتج قيمة كل من الزاوية α التي قذف بها الجسم و قيمة v_{0y} .

6- مثل كل من $v_x(t)$ و $v_y(t)$ في المجال الزمني $s(0 \leq t \leq 1.88)$.

7- استنتج من المنحنيين كل من المسافة الأفقية OM و الذروة h

التمرين 34، بكالوريا رياضيات 2012

في فبراير 2012 هبت عاصفة ثلجية على شمال شرق الجزائر ، فاستعملت الطائرات المروحية للجيش الوطني الشعبي لايصال المساعدات للمتضررين خاصة في المناطق الجبلية.



أولاً: تطير المروحية ثابت h من سطح الأرض بسرعة أفقية ثابتة قيمتها $v_0 = 50 \text{ m/s}$ يترك صندوق من مواد غذائية مركز عطائها G يسقط في اللحظة $t = 0$ انطلاقاً من نقطة O مبدأ الاحداثيات وبالسرع الابتدائية الأفقية $\vec{v}_0$ ليرتطم بسطح الأرض في النقطة M .

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد:

أ- المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $z(t)$.

ب- معادلة المسار $z(x)$.

ج- احداثيات نقطة السقوط M .

د - الزمن اللازم لوصول الصندوق للأرض.

ثانياً: لكي لا تتلف المواد الغذائية عند الارتطام بسطح الأرض ، تم ربط الصندوق بمظلة تمكنه من النزول شاقولياً ببطء. تبقى المروحية على نفس الارتفاع h السابق في النقطة M ، ليترك الصندوق يسقط شاقولياً دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$. يخضع الصندوق لقوة احتكاك الهواء نعبر عنها بالعلاقة $\vec{f} = -100 \times \vec{v}$ حيث: $\vec{v}$ يمثل شعاع سرعة الصندوق في اللحظة t مع اهمال دافعة ارخميدس خلال السقوط.

1- جد المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة مركز عطالة الصندوق.

2- يمثل الشكل تطور سرعة مركز عطالة الصندوق بدلالة الزمن t .

أ- جد السرعة الحدية v_l .

ب- حدد قيمتي السرعة والتسارع في اللحظتين: $t = 0$ و $t = 10 \text{ s}$.

يعطى: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ، $h = 405 \text{ m}$ ، كتلة الصندوق والمظلة $m = 150 \text{ kg}$.

التمرين 35 :

يقذف اللاعب كرة التنس $m = 58 \text{ g}$ لإنجاز الإرسال شاقولياً نحوى الأعلى لتصل إلى ارتفاع Z_0 فيضربها بمضربه فتكتسب سرعة $v_0 = 28 \text{ m/s}$ يكون منحاه أفقي. على الكرة اجتياز شباك موضوع على بعد 12 m من اللاعب علوه $Z_0 = 0.9 \text{ m}$. ندرس حركة الكرة في

المعلم $(ox; oz)$ الذي نعتبره عطاليا .تؤخذ $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد:

أ/ المعادلتين التفاضليتين للحركة و المعادلتين الزمنيتين للحركة.

ب/ استنتج معادلة المسار $z = f(x)$.

ج/ ماهي قيمة Z_0 حتى تمر الكرة على ارتفاع 10cm من الشبكة.

د/ إذا كان طول الملعب 24m ، هل تصطدم الكرة بالأرض قبل خروجها من الملعب؟ برر إجابتك.


هـ/ احسب سرعة الكرة v لحظة اصطدامها بالأرض.

2- نفرض ان الكرة تتطلق من جديد بعد اصطدامها بالأرض بنفس السرعة السابقة v وبزاوية عن الأفق $\beta = 15^\circ$ في اتجاه اللاعب

الثاني الموجود في خط نهاية الملعب أي على بعد 24m من اللاعب الاول، باعتبار نقطة الاصطدام بالأرض هي مبدأ الفواصل.

أ/ اكتب معادلة المسار الجديد.

ب/ ما هي قيمة الارتفاع h لكرة عند وصولها الى اللاعب الثاني؟



تمرين 36: بكالوريا علوم تجريبية 2016

نهمّل تأثير الهواء ونأخذ $g = 9,8\text{m/s}^2$.

شاحنة تسير على طريق مستقيم افقي، في لحظة نعتبرها مبدأ لقياس الأزمنة $t = 0$ تقذف العجلة الخلفية للشاحنة نحو الورا من نقطة O من

سطح الأرض حجرا نعتبره نقطيا بسرعة ابتدائية $v_0 = 12\text{m/s}$ يصنع حاملها زاوية $\alpha = 37^\circ$ مع الأفق فيرتطم بالنقطة M من الزجاج

الامامي لسيارة تسير خلف الشاحنة وفي نفس جهة حركتها بسرعة ثابتة قدرها 90km/h . في اللحظة $t = 0$ كانت المسافة الافقية بين

النقطة O والنقطة M : $d = 44\text{m}$ انظر الشكل.

1- ادرس حركة الحجر في المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ثم استخرج العبارتين الحرفيتين للمعادلتين الزميتين للحركة $x(t)$ و $z(t)$.

2- اكتب معادلة مسار الحجر $z = f(x)$.

3- اكتب المعادلة الزمنية $x_M(t)$ لحركة النقطة M في المعلم


$(O, \vec{i}, \vec{j})$.

4- احسب قيمة t_M لحظة ارتطام الحجر بالزجاج الامامي للسيارة

واستنتج الارتفاع h للنقطة M عن سطح الأرض.

5- باستعمال معادلة انحفاظ الطاقة احسب سرعة ارتطام الحجر


بزجاج السيارة.




تمارين حول الحركات على المستوي

التمرين 37: بكالوريا علوم تجريبية 2013 :

يجر حمزة صندوقا كتلته $m = 10\text{kg}$ على طريق مستقيم افقي (AC) مركز عطالته G بقوة $\vec{F}$ ثابتة حاملها يصنع زاوية $\alpha = 30^\circ$ مع المستوي الافقي . حيث الجزء (AB) أملس والجزء (BC) خشن . التمثيل البياني يمثل تغيرات سرعة G بدلالة الزمن t .



الشكل-2



الشكل-3

- 1- أ- استنتج بيانيا طبيعة الحركة والتسارع لـ G لكل مرحلة.
ب - استنتج المسافة المقطوعة AC .
- 2- أ- اكتب نص القانون الثاني لنيوتن.
ب - جد عبارة شدة قوة الجر $\vec{F}$ ثم احسبها .
ج - جد عبارة شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ثم احسبها .
د - فسر لماذا يمكن للسرعة أن تصبح ثابتة في المرحلة الاخيرة .

التمرين 38: بكالوريا رياضيات 2010

ينزل جسم (S) كتلته $m = 100\text{g}$ على طول مستوي مائل عن الافق بزاوية $\alpha = 20^\circ$ وفق المحور $\vec{x}\vec{x}'$ ، قمنا بالتصوير المتعاقب بكاميرا رقمية وعولج شريط الفيديو ببرمجية Aviméca بجهاز الاعلام الآلي وتحصلنا على النتائج التالية:

$t(s)$	0	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12
$v(m/s)$	v_0	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32

1- ارسم البيان : $v = f(t)$.

2- بالاعتماد على البيان:

أ- بين طبيعة حركة الجسم (S) واستنتج القيمة التجريبية للتسارع a .

ب- استنتج قيمة السرعة v_0 في اللحظة $t = 0$.


ج- احسب المسافة المقطوعة بين $t_1 = 0.04\text{s}$ و $t_2 = 0.08\text{s}$.

3- بفرض أن الاحتكاكات مهمة :

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد العبارة الحرفية للتسارع a_0 ثم احسب قيمته

ب- قارن بين a_0 و a ، ماذا تستنتج؟

4- أوجد شدة القوة $\vec{f}$ النمذجة للاحتكاكات على طول المستوي.



(الشكل-5)

نعبر $g = 10 \text{ m/s}^2$

يتحرك جسم (S) نعتبره نقطيا كتلته $m = 900 \text{ g}$ على مسار مستقيم AB مائل عن الافق بزاوية $\alpha = 35^\circ$ كما هو موضح بالشكل المقابل . ينطلق الجسم من النقطة A دون سرعة ابتدائية . باستعمال تجهيز مناسب ننجز التسجيل المتعاقب لمواقع الجسم اثناء حركته على المسار AB فنحصل على النتائج المدونة في الجدول الاتي:

الموضع	G_0	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_6	G_7	G_8
اللحظة $t(s)$	0.00	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40	0.48	0.56	0.64
الفاصلة $x(m)$	0.0	1.5	6.0	13.5	24.0	37.5	54.0	73.5	96.0

ينطبق الموضع G_0 على النقطة A وينطبق الموضع G_8 على النقطة B ، والمدة الزمنية التي تفصل بين تسجيلين متتاليين هي $\tau = 80 \text{ ms}$.

1- أ- احسب السرعة اللحظية للجسم عند الموضع G_2 ، G_3 ، G_4 ، G_5 ، G_6 .

ب - أوجد قيمة تسارعه عند الموضع G_3 ، G_4 ، G_5 .

ج - استنتج طبيعة الحركة .

2- باهمال قوى الاحتكاك المؤثرة على الجسم (S) :

أ- مثل القوى المطبقة على الجسم (S) .

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم السطحي الارضي الذي نعتبره غاليليا ، أوجد عبارة

التسارع a لمركز عطالة الجسم ثم احسب قيمته .

ج - قارن بين القيمة النظرية للتسارع وقيمه التجريبية الموجودة سابقا ، ماذا تستنتج؟

3- باعتبار قوى الاحتكاك تكافئ قوة وحيدة $\vec{f}$ ثابتة في الدة ومعاكسة لجهة الحركة .

أ- احسب شدة القوة $\vec{f}$.

ب- باستخدام مبدأ انحفاظ الطاقة أوجد قيمة سرعة الجسم عند النقطة B .

التمرين 40: بكالوريا رياضيات 2012






1- لغرض حساب زاوية الميل α لمستوي يميل عن الافق قام فوج من التلاميذ بقذف جسم

صلب (S) كتلته $m = 1 \text{ kg}$ في اللحظة $t = 0$ من النقطة O بسرعة $\vec{v}_0$ نحو الاعلى

وفق خط الميل الاعظم لمستوي أملس. باستعمال تجهيز مناسب ، تمكن التلاميذ من

دراسة حركة مركز عطالة (S) والحصول على أحد مخططات السرعة $v = f(t)$

التالية:



أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، ادرس طبيعة حركة الجسم (S) بعد لحظة قذفه من O .

ب- من بين المخططات الاربعة ، ما هو المخطط الموافق لحركة الجسم (S) ؟ برر .

ج - احسب قيمة الزاوية α .

د- احسب المسافة المقطوعة بين اللحظتين $t = 0$ و $t = 2s$.

2- في الحقيقة يخضع الجسم أثناء انزلاقه على المستوي المائل الى قوة احتكاك شدتها ثابتة f .

أ- أحص ومثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم (S) .

ب- ادرس حركة مركز عطالة الجسم (S) ، ثم استنتج العبارة الحرفية لتسارع حركته.


ج - احسب قيمة التسارع من اجل $f = 1N$

$$g = 9.8m \times s^{-2}$$

التمرين 41: بكالوريا رياضيات 2014،

تمثل الجملة المبينة في الشكل 7- جسما نقطيا (S_1) كتلته $m_1 = 400g$ ينزلق بدون احتكاك على سطح مستو مائل عن الافق بزاوية

$\alpha = 30^\circ$ ويرتبط بواسطة خيط مهمل الكتلة وعديم الامتطاط ويمر على محز بكرة مهمل الكتلة بجسم صلب (S_2) كتلته $m_2 = 400g$.




نترك الجملة عند اللحظة $t = 0$ فينطلق الجسم (S_1) من النقطة A بدون سرعة ابتدائية .

$$g = 10m \times s^{-2}$$

أ- مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسمين (S_1) و (S_2) .

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن حدد طبيعة حركة الجسم (S_1) ثم احسب قيمة تسارع مركز عطالته .

ج - جد سرعة الجسم (S_1) عند النقطة B علما أن $AB = 1.25m$ ثم استنتج المدة المستغرقة لذلك .



1- مكنت الدراسة التجريبية من رسم منحنى تغيرات سرعة الجسم (S_1) بدلالة الزمن

$v = f(t)$ في الشكل 8 .

أ- من المنحنى جد قيمة تسارع الجسم (S_1) وقارنها مع المحسوبة سابقا .

ب- فسر اختلاف قيمة التسارع في الحالتين .

ج - بناء على هذا التفسير بين أن سرعة الجسم (S_1) تحقق المعادلة التفاضلية

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{g}{2}(1 - \sin \alpha) - \frac{f}{2m_1}$$

التالية: حيث f قوة الاحتكاك التي يؤثر بها سطح

المستوي المائل على الجسم (S_1) .

د - استنتج قيمة كل من شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ وشدة توتر الخيط $\vec{T}$.

التمرين 42: بكالوريا رياضيات 2011

يجر جسم (S_2) كتلته $m_2 = 600g$ بواسطة خيط مهمل الكتلة وعديم الامتطاط يمر على محز بكرة مهمل الكتلة عربة (S_1) كتلتها $m_1 =$


$800g$ تتحرك على مستوي يميل عن الافق بزاوية $\alpha = 30^\circ$ في وجود قوى احتكاك $\vec{f}$ شدتها ثابتة ولا تتعلق بسرعة العربة . في اللحظة

$t = 0$ تنطلق العربة من نقطة A دون سرعة ابتدائية فتقطع المسافة $AB = x$ كما هو موضح في

الشكل . نأخذ كمبدأ للفواصل النقطة A .

1- أعد رسم الشكل وأحص عليه القوى الخارجية المؤثرة على (S_1) و (S_2) .

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على (S_1) و (S_2) :




أ- بين أن المعادلة التفاضلية للفاصلة x تعطى بالعلاقة التالية: $\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{(m_2 - m_1 \sin \alpha)}{m_1 + m_2} g - \frac{f}{m_1 + m_2}$.

ب- استنتج طبيعة حركة الجسم (S_1).

ج- باستغلال الشروط الابتدائية أوجد حلا للمعادلة التفاضلية السابقة.

3- من اجل قيم مختلفة لـ x كررنا التجربة السابقة عدة مرات فتحصلنا على منحنى بياني يلخص طبيعة حركة الجسم (S_1)



أ- من بين المنحنيات الثلاث 1-2-3 ما هو البيان الذي يتفق مع الدراسة النظرية ؟ علل.


ب- احسب من البيان قيمة التسارع a .

- استنتج قيمة كل من قوة الاحتكاك f وتوتر الخيط T علما ان $g = 9.8 m/s^2$

التمرين 43:


تتكون الجملة في الشكل-1 من عربتين A كتلتها $m_A = 0.5 kg$ وعربة B كتلتها m_B موضوعتين على سكتين مائلتين عن الافق بزاويتين $\alpha = 30^\circ$ و $\beta = 45^\circ$ بالنسبة للافق، موصولتين بخيط عديم الامتطاط ومهمل الكتلة يمر بمحز بكرة مهمة الكتلة.

1- أوجد العلاقة التي تربط بين m_B ، m_A ، α و β عند التوازن وذلك بإهمال الاحتكاكات . ثم استنتج كتلة العربة m_B .



2- نضع فوق العربة B كتلة اضافية بحيث تصبح $m_B = 2m_A$ ثم نترك الجملة لحالها دون سرعة ابتدائية .

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن حدد طبيعة الحركة ثم بين ان تسارعها $a = 3 m/s^2$.



ب- ما هي سرعة الجملة بعد 5s من بدأ الحركة .

3- بتقنية التصوير المتعاقب تمكنا من رسم منحنى السرعة بدلالة الزمن :

أ- احسب قيمة التسارع وقارنها مع المحسوبة سابقا .

ب- ما هو سبب الاختلاف بين القيمتين.

ج- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن عبارة التسارع من الشكل:

$$a = \frac{g}{3} (2 \sin \beta - \sin \alpha) - \frac{2f}{3m_A}$$

د- احسب قيمة الاحتكاك f وتوتر الخيط T . $g = 10 m/s^2$

- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد شدة القوة $\vec{F}$ حتى تبقى للجملة (S) نفس التسارع في الجزء AB

3- تصل الجملة (S) الى النقطة C بسرعة $v_C = 25 \text{ m/s}$ وتغادرها لتسقط في النقطة P .

أ- باعتبار لحظة المغادرة مبدأ الأزمنة ، ادرس حركة مركز عطالة الجملة (S) في المعلم (Cx, Cy) ثم جد معادلة مسارها .

ب- هل يجتاز الدراج الخندق أم لا ؟ برر اجابتك علما أن : $d = 40\text{m}$ و $BC = 56.3\text{m}$.

التمرين 46: بكالوريا رياضيات 2015،

بمناسبة البطولة العلمية للترليج على الجليد اختار المنظمون المسلك الموضح بالشكل-5 والمتكون من:

AB : مستوي مائل زاوية ميله $\alpha = 30^\circ$ وطوله $AB = 50\text{m}$.

BC : مستوي افقي.

CO : هوة ارتفاعها h عن سطح الارض.

نفرض أن كتلة المتزليج ولوازمه هي: $m = 80\text{kg}$ ، $g = 10\text{m/s}^2$. ينطلق

المتبارون فرادى من قمة المستوي المائل دون سرعة ابتدائية.

1- أ- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (المتزليج) بين الموضعين A و B ،

استنتج شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ التي نعتبرها ثابتة على طول المسار ABC علما أنه يبلغ الموضع B بالسرعة $v_B = 20 \text{ m/s}$.

ب - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن حدد طبيعة الحركة على المسار AB واحسب تسارعها.

2- يغادر المتزليج المستوي الافقي BC عند الموضع C في لحظة نعتبرها مبدأ الأزمنة ليسقط

في الموضع E . نهمل مقاومة الهواء ودافعة ارخميدس .

- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة ، جد المعادلتين الزمنيةتين للحركة $x(t)$ و $y(t)$ في

المعلم (ox, oy) المرتبط بمرجع غاليلي، ثم استنتج معادلة المسار .

3- بيان الشكل المقابل يمثل تغيرات مربع سرعة المتزليج بدلالة مربع الزمن من لحظة مغادرة

المستوي الافقي حتى وصوله الموضع E .

أ- اكتب عبارة السرعة v بدلالة v_x و v_y ثم أوجد العلاقة النظرية بين v^2 و t^2 .

ب- استنتج بيانيا قيمة السرعة عند كل من الموضعين C و E .

ج - احسب الارتفاع h .

التمرين 47 : بكالوريا رياضيات 2016

لمعرفة الشدة f لقوة الاحتكاك التي يخضع لها الجسم الصلب (S) أثناء حركته على مستو مائل $AO = d = 1,5\text{m}$ ، زاوية ميله عن الأفق

$\alpha = 45^\circ$ ، نتركه دون سرعة ابتدائية من النقطة A وعندما يصل الى النقطة O يغادرها ليسقط على الأرض عند النقطة N .

نعتبر $g = 9.8\text{m/s}^2$ ، نعتبر (S) نقطيا وكتلته $m = 500\text{g}$.

بحصة الاعمال المخبرية رسم التلاميذ البيان الممثل لتغيرات سرعة الجسم (S) بدلالة الزمن و< لك انطلاقا من التصوير المتعاقب لحركته

على الجزء AO وسجلوا كذلك احداثي النقطة N موضع سقوط الجسم (S) على سطح الراض بعد مغادرته المستوي المائل فوجدوا

$(x_N = 0.62\text{m} , y_N = h = 1.00\text{m})$

1- قياس f باستغلال التصوير المتعاقب: نرمز بـ a لتسارع (S) على الجزء AO .

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على (S) أثناء حركته على AO بين أن : $f = m(g \sin \alpha - a)$.

ب- باستغلال بيان الشكل أوجد قيمة التسارع a لحركة (S) ثم استنتج الشدة f لقوة الاحتكاك المؤثرة عليه .

2- قياس f باستغلال احداثيات النقطة N : باعتبار مبدأ الأزمنة اللحظة التي يغادر فيها الجسم (S) النقطة O .

أ- أوجد المعادلتين الزميتين $x(t)$ و $y(t)$ المميزيتين لحركة (S) في المعلم (Ox, Oy) .


ب- استنتج معادلة المسار $y = f(x)$.

ج- احسب v_0 طولية شعاع السرعة التي غادر بها الجسم (S) المستوي المائل.

د- استنتج من جديد قيمة a طولية شعاع تسارع (S) على الجزء AO .

هـ- باعتماد العلاقة المبينة في السؤال 1- أ ، أوجد من جديد الشدة f لقوة الاحتكاك.

3- اذا علمت ان مجال حدود أخطاء القياس هو: $1.8N \leq f \leq 2.0N$. ماذا تستنتج؟



التمرين 48: بكالوريا علوم 2015:

تعطى: $g = 10m/s^2$ ، ميله $\alpha = 30^\circ$ ، $AB = 2m$.

1- يتحرك جسم (S) ، الذي نعتبره نقطيا ، كتلته $m = 100g$ ، على مسار $ABCD$. ينطلق الجسم (S) من الموضع A بدون سرعة

ابتدائية ليصل الى الموضع B بسرعة $v_B = 2m/s$ ، ثم الى الموضع C بسرعة $\vec{v}_C$. يخضع الجسم (S) لقوة احتكاك ثابتة الشدة

ومعاكسة لجهة الحركة على المسار AB . تهمل قوى الاحتكاك على بقية المسار.

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة تسارع الحركة على المسار

AB .

ب- أوجد هذا التسارع ثم استنتج شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

ج - ما طبيعة الحركة على المسار BC ؟ علل اجابتك .

2- يغادر الجسم (S) الموضع C الذي يقع على ارتفاع $h = 0.8m$ عن المستوي الافقي الذي يشمل النقطتين O و D ، ليسقط في العواء


ويصل الى النقطة D بسرعة $\vec{v}_D$.

باعتبار اللحظة التي يصل فيها الجسم (S) الى الموضع C مبدأ للأزمنة ، وباهمال دافعة ارخميدس ومقاومة الهواء.

أ- بين ان معادلة مسار مركز عطالة الجسم (S) في المعلم $(O; \vec{i}; \vec{k})$ هي : $z = -\frac{g}{2v_C^2}x^2 + h$.

ب- حدد بعد النقطة D عن النقطة O (المسافة OD) .


ج - احسب قيمة v_D .



الشكل 6-

التمرين 49: بكالوريا علوم تجريبية 2014


نقذف في الحظة $t = 0$ جسما صلبا (S) نعتبره نقطة مادية كتلتها $m = 400g$ على مستوي أفقي بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ من النقطة A نحو النقطة B حيث $AB = 1.4m$. يخضع الجسم (S) أثناء حركتها لقوى احتكاك تكافئ قوة معاكسة لجهة الحركة وثابتة الشدة $\vec{f}$ الشكل-4-1 أ- مثل القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة الجسم (S) .



الشكل-4-

- ب - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية المميزة للحركة تعطى بالعلاقة : $\frac{dv}{dt} = -\frac{f}{m}$.
- ج - باعتبار النقطة A مبدأ للفواصل ، اكتب المعادلتين الزميتين $v(t)$ و $x(t)$ بدلالة : f ، v_0 و m .
- استنتج العلاقة النظرية $v^2 = f(x)$.

2- المنحنى - الشكل-5- يمثل تغيرات v^2 بدلالة x . استنتج قيمة السرعة الابتدائية v_0 وشدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.



الشكل-5-

- 3- يغادر الجسم (S) المستوي الأفقي AB في النقطة B بسرعة $\vec{v}_B$ ليسقط في الموضع E حيث : $\overline{BD} = 0.5m$.
- أ- ادرس طبيعة حركة مركز عطالة الجسم (S) بعد مغادرته النقطة B في المعلم (Bx, By) .

ب- اكتب معادلة مسار الحركة $y = f(x)$.

- ج - حدد المسافة الأفقية DE وسرعة الجسم (S) في الموضع E .
- يعطى : تهمل مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس.

$$g = 10m \times s^{-2}$$

التمرين 50: بكالوريا تقني رياضي 2008

ورد في مطوية أمن الطرق الجدول التالي:

سرعة السيارة $v(km/h)$	50	80	90	100	110
مسافة الاستجابة $d_1(m)$	14	22	25	28	31
المسافة الموافقة لمدة الكبح $d_2(m)$	14	35	45	55	67

عندما يريد سائق سيارة تسير بسرعة $\vec{v}$ التوقف فإن السيارة تقطع مسافة d_1 خلال مدة τ_1 قبل أن يضبط السائق على المكابح (تعرف τ_1 ب زمن استجابة السائق) وتقطع السيارة مسافة d_2 خلال مدة τ_2 زمن مدة الكبح ، تسمى D مسافة التوقف وتساوي مجموع المسافتين d_1 و d_2 : $D = d_1 + d_2$. أثناء عملية الكبح لا يؤثر المحرك على السيارة .

نقوم بدراسة G مركز عطالة سيارة كتلتها M على طريق مستقيمة أفقية في مرجع أرضي نعتبره غاليليا.

- 1- خلال مدة الاستجابة τ_1 نعتبر المجموع الشعاعي للقوى المؤثرة على السيارة معدوما .

أ- ما هي طبيعة حركة مركز عطالة السيارة؟

ب- استنادا الى قياسات الجدول أحسب قيم النسب $\frac{d_1}{v}$ مقدرة بالثانية . ماذا تستنتج؟


ج- احسب قيمة المدة τ_1 مقدرة بالثانية من أجل كل قيم d_2 في الجدول.

- 2- أ- نمذج خلال عملية الكبح الافعال المؤثرة على السيارة بقوى تطبق على مركز عطالتها . نعتبر القوى - قوة الكبح وقوى الاحتكاك ومقاومة الهواء- المؤثرة على السيارة مكافئة لقوة واحدة $\vec{F}_{f/G}$ ثابتة القيمة و جهتها عكس جهة شعاع السرعة..
- ب- لتكن v قيمة سرعة مركز عطالة السيارة في بداية الكبح . أوجد العلاقة الحرفية بين v^2 و d_2 بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة.
- ج- باستعمال الجدول السابق ارسم المنحنى البياني $v^2 = g(d_2)$.
- د- باستعمال البيان استنتج قيمة $\vec{F}_{f/G}$ تعطى كتلة السيارة: $M = 900kg$.

التمرين 51: بكالوريا تقني رياضي 2008

ملاحظة: نهمل تأثير الهواء وكل الاحتكاكات .

- يتحرك جسم نقطي (S) دون سرعة ابتدائية من النقطة A لينزلق وفق خط الميل الاعظمي AB لمستوي مائل يصنع مع الافق زاوية $\alpha = 30^\circ$ ، المسافة $AB = L$.
- يتصل AB مماسيا في النقطة B بسلك دائري BC مركزه O ونصف قطره r بحيث تكون النقاط A ، B ، C و O في نفس المستوي الشاقولي والنقطتان B و C على المستوي الافقي.
- يعطى: كتلة الجسم (S) : $m = 0.2kg$ ، $g = 10 m/s^2$ ، $L = 5 m$ ، $r = 2 m$.



- 1- أوجد عبارة سرعة الجسم (S) عند مروره بالنقطة B بدلالة L ، g و α ثم احسب قيمتها.
 - 2- حدد خصائص شعاع السرعة للجسم (S) في النقطة C .
 - 3- أ- أوجد بدلالة m ، g و α عبارة شدة القوة التي تطبقها الطريق على الجسم (S) خلال انزلاقه على المستوي المائل ثم احسب قيمتها.
 - ب- لتكن I أخفض نقطة من المسار الدائري BC . يمر الجسم (S) بالنقطة I بالسرعة $v_I = 7.37 m/s$. احسب شدة القوة التي يطبقها الطريق على الجسم (S) عند النقطة I .
 - 4- عند وصول الجسم (S) الى النقطة C يغادر المسار BC ليقفز في الهواء.
- أ- أوجد في المعلم $(\vec{Cx}, \vec{Cy})$ المعادلة الديكارتية $y = f(x)$ لمسار الجسم (S) . نأخذ مبدأ الزمنة $t = 0$ لحظة مغادرة الجسم (S) النقطة C .
- ب- يسقط الجسم (S) على المستوي المار بالنقطتين B و C في النقطة M . احسب المسافة CM .

التمرين 56 :

ينزل جسم صلب: (S) يمكن اعتباره نقطياً كتلته: $m = 0.1\text{kg}$ على طريق: ABCD. (أنظر الشكل)

* AB منحدر، تقع A على ارتفاع h من الأفقي المار من B.

* CD طريق على شكل ربع دائرة مركزها: O ونصف قطرها: $r = 3\text{m}$ ، تقع في مستو شاقولي، تهمل قوى الاحتكاك على هذا الجزء من المسار.

1- ينطلق الجسم (S) من النقطة A دون سرعة ابتدائية ليصل إلى B بسرعة: $v_B = 10\text{m/s}$. بفرض قوى الاحتكاك مهملة:

أ - أوجد الارتفاع الذي هبط منه الجسم.

ب - ما طبيعة حركة الجسم: (S) عند انتقاله من: A إلى B؟

ج - أحسب تسارع هذه الحركة -إن وجد- علماً أن: $AB = 10\text{m}$ ، $g = 10\text{m/s}^2$.

2- يواصل الجسم: (S) حركته على الجزء: (BC) في وجود قوى احتكاك شدتها ثابتة:

أ - أرسم القوى الخارجية المطبقة على الجسم: (S).


ب- احسب شدة قوى الاحتكاك إذا علمت أن السرعة في (C) هي: $v_C =$

$$3\text{m/s}$$

3- يغادر الجسم: (S) المسار الدائري في النقطة: (E)،

أ/ أوجد عبارة سرعة الجسم: (S) في النقطة E بدلالة: r ، θ ، g .

ب/ أوجد قيمة الزاوية: θ .



التمرين 58: بكالوريا رياضيات 2014:

لدراسة حركة جسم صلب (S) كتلته $m = 100\text{g}$ على السطح الدائري الشاقولي الالمس BC نصف قطره $r = 10\text{m}$ ، نقذفه من النقطة

A بسرعة ابتدائية افقية $\vec{v}_A$ ليتحرك على السطح الافقي $AB = d = 1\text{m}$ ، حيث تكون شدة قوة الاحتكاك على هذا الجزء ثابتة $f =$

0.8N و جهتها معاكسة لجهة الحركة، يمر الجسم (S) بالنقطة B بداية السطح BC بالسرعة $\vec{v}_B$ ويواصل حركته عليه ليغادره عند النقطة

N. (الشكل 7-).

1- أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن حركة (S) على الجزء AB

مستقيمة متباطئة بانتظام.

ب - بين أن سرعة القذف يمكن كتابتها بالعبارة التالية:

$$v_A^2 = v_B^2 + \frac{2 \times d \times f}{m}$$

2- الشكل 8- يمثل منحنى تغيرات $\cos \theta$ بدلالة v_B^2 ، حيث θ هي

الزاوية التي من أجلها يغادر الجسم (S) السطح الدائري في النقطة N بالسرعة $\vec{v}_N$

أ - بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة جد عبارة v_N^2 بدلالة v_B^2 ، g ، r و θ .

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد عبارة $\vec{R}$ لفعل السطح الدائري على الجسم (S).


ج - جد العبارة النظرية لـ $\cos \theta$ بدلالة v_B^2 ، g و r التي من أجلها يغادر

الجسم (S) السطح الدائري في النقطة N.

د - بالاعتماد على السؤال (ج) والمنحنى جد قيمة g تسارع الجاذبية الأرضية في

مكان التجربة.

3- ما هي أكبر قيمة للزاوية θ وقيمة السرعة v_A عندئذ؟



الشكل 7-

