


**التمرين الأول: (07 نقاط)**

**الجزء الأول:**



نريد أن نتعرف على عينة من مادة مشعة من خلال زمن نصف العمر ومن أجل ذلك نقوم بواسطة عداد رقمي (مقياسه) وكاشف أشعة بإنجاز القياسات اللازمة ورم البيان الممثل في الشكل 01.

1. ماذا تلاحظ فيما يخص البيان  $\ln N = f(t)$ ، عبر عنه بمعادلة رياضية.
2. أعط عبارة  $\ln N$  بدلالة  $\lambda$  و  $N_0$  و  $t$ .
3. جد بيانيا قيمة ثابت النشاط الإشعاعي  $\lambda$ .
4. أوجد العلاقة التي تربط بين  $t_{1/2}$  و  $\lambda$  (ثابت النشاط الإشعاعي).
5. احسب زمن نصف العمر  $t_{1/2}$ . استنتج رمز نواة العينة.
6. لتكن  $N_0$  عدد الأنوية عند اللحظة  $t = 0$  وكتلة هذه العينة هي  $m_0$ . أوجد قيمتي كل من  $N_0$  و  $m_0$ .

**الجزء الثاني:**

لقد قام العلماء في إحدى البلدان بأخذ عينات من أراضي مردومة خلال زلزال قديمة، حيث استطاعوا قياس من أجل كل زلزال النشاط لنظير الكربون 14 المشع  $\beta^-$  والذي نصف عمره هو 5700 ans، فكانت قياسات هذه النشاطات من أجل عينات مختلفة في 1979 كالتالي: 0,251، 0,223، 0,215، 0,233 وحدة دولية.

بينما نشاط أرض غير مردومة والذي يبقى ثابتا هو 0,255 Bq.


1. ما هو العمر التقريبي للعينات المدروسة؟
2. ما هي تواريخ حدوث الزلازل؟

**يعطى:**

$$t_{1/2}(^{209}\text{Po}) = 138,3 \text{ jours} \quad t_{1/2}(^{254}\text{Es}) = 276 \text{ jours} \quad t_{1/2}(^{253}\text{Fm}) = 3 \text{ jours}$$

**التمرين الثاني: (06 نقاط)**

يستعمل خليط من اليورانيوم  $^{235}\text{U}$  واليورانيوم المخصب  $^{238}\text{U}$  كوقود لمفاعل غواصة نووية. تنتج الطاقة المستهلكة من طرف الغواصة من انشطار اليورانيوم  $^{235}\text{U}$  إثر اصطدامها ببترونات وذلك حسب معادلة التفاعل النووي التالي:



1. أوجد  $Z$  و  $y$  في المعادلة النووية السابقة.
2. أحسب الطاقة المحررة بال MeV من هذا التفاعل.
3. مثل الحصيلة الطاقوية للتفاعل النووي الحادث.
4. أوجد المدة الزمنية التي يستهلك خلالها كتلة  $m = 1 \text{ g}$  من اليورانيوم  $^{235}\text{U}$  من طرف المفاعل النووي للغواصة علما أن استطاعته 15 MW.

**يعطى:**

$$m(^{235}_{92}\text{U}) = 234,99345 \text{ u} \quad m(^{139}_{54}\text{Xe}) = 138,88917 \text{ u} \quad m(^{94}_{38}\text{Sr}) = 93,89451 \text{ u} \quad m({}^1_0\text{n}) = 1,00866 \text{ u}$$

$$1 \text{ u} = 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2} \quad 1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} \quad 1 \text{ u} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ Kg} \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad N_A = 6,02 \times 10^{23}$$

## التمرين التجريبي: (07 نقاط)

ماء جافيل محلول مائي يتميز بخصائص مطهرة فهو منتج فعال ضد العدوى البكتيرية والفيروسية يحتوي على شوارد الهيبوكلوريت  $ClO^-$ ، شوارد  $Cl^-$  وشوارد  $Na^+$ . تضيفي شاردة الهيبوكلوريت  $ClO^-$  على ماء جافيل الصفة المؤكسدة. يحدث في الضوء أن شوارد  $ClO^-$  تؤكسد بشكل بطيء جزيئات الماء  $H_2O$  وبالتالي ماء جافيل سيفقد فعاليته تدريجيا. وبوجود شوارد الكوبالت  $Co^{2+}$  فإن هذا التفاعل يكون أسرع.

1. أكتب معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية. تعطى الثنائيتان  $O_2/H_2O$  و  $ClO^-/Cl^-$ .
2. لدراسة سرعة تفكك ماء جافيل (بوجود شوارد  $Co^{2+}$ ) نقيس في درجة الحرارة  $20^\circ C$  وتحت ضغط  $1,013 \times 10^5 Pa$  حجم غاز الأكسجين  $V_{O_2}$  المتشكل في كل لحظة  $t$  فنتحصل على جدول القياسات التالي:

|                |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $t (s)$        | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 |
| $V_{O_2} (mL)$ | 0 | 79 | 148 | 203 | 248 | 273 | 298 | 312 | 316 | 316 |
| $x (mmol)$     |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |

- أ- انجز جدول تقدم التفاعل؟  
 $1 \text{ cm} \rightarrow 60 \text{ s}$   
 $1 \text{ cm} \rightarrow 1,3 \text{ mmol}$
- ب- أكمل جدول القياسات بحساب قيم تقدم التفاعل  $x$  وأرسم البيان  $x = f(t)$ . باستعمال الرسم التالي:  
 $V_M = 24 \text{ l/mol}$  للغازات المولي الحجم  
 ج- عين التقدم الأعظمي  $x_{max}$  للتفاعل ثم استنتج التركيز المولي الابتدائي  $[ClO^-]_0$  لشوارد الهيبوكلوريت؟ حجم ماء جافيل المستعمل  $V = 0,11 \text{ l}$

3. عرف زمن نصف التفاعل  $t_{1/2}$  واحسب قيمته.

4. أثبت صحة العلاقة:

$$\frac{dn_{ClO^-}}{dt} = -2 \frac{dx}{dt}$$

5. احسب السرعة الحجمية لاختفاء شوارد  $ClO^-$  في اللحظات  $t = 120 \text{ s}$ ،  $t = 360 \text{ s}$ . قارن بينهما؟

6. في حالة عدم وجود الشوارد  $Co^{2+}$ . أرسم كيفيا شكل المنحنى  $x = g(t)$  على البيان السابق.