

السلسلة رقم 03

عموميات على الدوال



- مجموعة تعريف دالة
- اتجاه التغير على مجال
- القيم الحدية
- شفعية دالة
- الفراءة البيانية

3 $f(x) = x^{2021} + \frac{1}{x^{2021}}$ 4 $f(x) = x^4 - 2|x|$

5 $f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 5}$ 6 $f(x) = \frac{3x+1}{x^2}$

7 $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{2x^2+1}}$ 8 $f(x) = x - |x^2 - 1|$

04 التمرين رقم

(1) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$:-

$$2f(x) + f(-x) = 3|x| - \sqrt{x^2 + 1}$$

✓ بين أن f دالة زوجية ، ثم استنتج عبارة $f(x)$ بدلالة x .

(2) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$:-

$$3g(-x) + g(x) = x^3 + 4x$$

✓ بين أن g دالة فردية ، ثم استنتج عبارة $g(x)$ بدلالة x .

05 التمرين رقم

لكن f الدالة المعرفة :- $f(x) = 3 - \frac{1}{x+1}$ ،

(C_f) نمثلها البياني .

(1) عين D مجموعة تعريف الدالة f .

(2) احسب $f(0)$ ، $f(-10)$ ، $f(7)$ و $f(\sqrt{3})$.

(3) جد سوابق العدد 0 بالدالة f .

(4) عين قيمتي العددين الحقيقين α و β حتى تكون

$A(\alpha; 4)$ و $B(5; \beta)$ نقطتين من (C_f) .

(5) ادرس اتجاه تغير f على D ثم شكّل جدول تغيراتها.

01 التمرين رقم

عين مجموعة تعريف الدالة f في كل حالة مما يلي :

1 $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$ 2 $f(x) = \frac{x^3 - 3x}{2}$

3 $f(x) = x^2 - \sqrt{1-4x}$ 4 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+3}$

5 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{|x|-2}$ 6 $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-9}$

7 $f(x) = \sqrt{-x} + \sqrt{x+1}$ 8 $f(x) = \sqrt{|x|+5}$

02 التمرين رقم

ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال I في كل حالة من الحالات الآتية :

1 $f(x) = -\frac{3}{2}x + 7$; $I = \mathbb{R}$

2 $f(x) = 1 - x^2$; $I = [0; +\infty[$

3 $f(x) = 3 + \sqrt{5-x}$; $I =]-\infty; 5]$

4 $f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{2}$; $I = \left]-\infty; \frac{1}{2}\right]$

5 $f(x) = \frac{4}{x+2} - 10$; $I =]-2; +\infty[$

6 $f(x) = \frac{-1}{\sqrt{x-3}}$; $I =]3; +\infty[$

03 التمرين رقم

ادرس شفعية الدالة f في كل حالة مما يلي :

1 $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ 2 $f(x) = \sqrt{x^2+2020}$


(3) فـارن بين العددـين $g(-0,5)$ و $g(-0,25)$ ، ثمّ بين $g\left(\frac{5}{2}\right)$ و $g\left(\frac{4}{3}\right)$.

(4) شكّل جدول تغـيـرات الدالـة f المعـرفـة على المـجال $[-5;4]$: $f(x) = -g(x)$.

(5) أنشئ (C_g) و (C_f) في نفس المعلم.

08 التمرين رتم

f و g دالتان معرفتان بيانيا كما في الشكل الموالي.



قراءة بيانية:

(1) عيّن D_g و D_f .

(2) عيّن الصور $f(1)$ ، $f(-2)$ ، $g(0)$ و $g(3)$.

(3) فـارن بين $f\left(\frac{1}{3}\right)$ و $f\left(\frac{2}{5}\right)$ مع التبرير.

(4) عيّن القيم الحديّة للدالة g .

(5) حدّد إشارة $f(x)$ و $g(x)$ على المجال $[-3;3]$.

(6) حدّد شفعيـة الدالـة f مع التعليل.

(7) شكّل جدول تغـيـرات كل من الدالتين f و g .

(8) حل بيانيا المعادلات و المتراجحات التالية:

$$g(x) \geq 0 \quad ; \quad f(x) + 1 = 0$$

$$f(x) = g(x) \quad ; \quad g(x) < f(x)$$

06

التمرين رتم

باستعمال (C_f) منحنى الدالة f الممثل في الشكل أدناه، أجب عن الأسئلة التالية:

(1) عيّن D_f .


(2) عيّن $f(-2)$ و $f(0)$.

(3) حل بيانيا المعادلة $f(x) = 0$.

(4) شكّل جدول إشارة الدالة f .

(5) عيّن القيم الحديّة للدالة f .

(6) شكّل جدول تغـيـرات الدالة f .



07

التمرين رتم

g دالة معرفّة على $[-5;4]$ بجدول تغـيـراتها كما يلي:

x	-5	-2	0	1	2	4
$g(x)$	-2		0	2	0	-1

(C_g) نمثلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم

متعامد متجانس.

(1) أ- ما هي سوابق العدد 0 بالدالة g ؟

ب- استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $[-5;4]$.

(2) عيّن -إن وجد- القيم الحديّة للدالة g .


09 التمرين رقم

الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - 2|x| + 3$ ،
(C_f) نُمثلها البياني.

- (1) اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
- (2) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$ ، فسر النتيجة بيانيا.
- (3) ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $]-\infty; 0]$ و $[0; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (4) استنتج أن f نفل قيمة حدة بطلب تعيينها.
- (5) أنشئ (C_f) في معلم متعامد متجانس.
- (6) حل بيانيا المتراجحة $f(x) + 3 > 0$ ، ثم تحقّق جديبا من النتائج.

10 التمرين رقم

الدالة المعرفة بتمثيلها البياني (C_f) كما يلي:



(1) قراءة بيانبة:

- أ- عيّن D_f ، $f(-1)$ ، $f(0)$ و $f(1)$.
- ب- حدّد السوابق الممكنة للعددين 0 و 3 بالدالة f .

ج- شكّل جدول تغيرات الدالة f .

د- حل بيانيا المتراجحة $f(x) > 0$.

(2) علما أن عبارة f تكتب على الشكل:

$f(x) = ax^2 + bx + c$ ، حيث a ، b و c أعداد حقيقيّة.

أ- اكتب كلا من $f(-1)$ ، $f(0)$ و $f(1)$ بدلالة a ،

b و c .

ب- اعتمدا على نتائج السؤال (1-أ)، جد قيم الأعداد

a ، b و c .

(3) دالة نألفبة نُمثلها البياني على $\mathbb{R}$ هو المستقيم

(D) المار بالنقطتين $A(0;3)$ و $B(3;0)$.

أ- عيّن عبارة الدالة g ، ثم ارسم (D) في المعلم السابق.

ب- حل بيانيا المعادلة $f(x) = g(x)$ والمتراجحة

$f(x) \leq g(x)$.

11 التمرين رقم

إليك فيما يلي جزء من جدول تغيرات دالة f زوجية على مجموعة تعريفها، وليكن (C_f) نُمثلها البياني.

x	-4	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	1	0	-3

(1) عيّن D_f ، ثم أكمل الجدول أعلاه.

(2) فارن بين $f(-2)$ و $f(-\frac{11}{8})$ ، ثم بين $f(1)$

و $f(\frac{7}{5})$ مع التعليق.

(3) عيّن سوابق العدد 0 بالدالة f ، ثم استنتج إشارة

$f(x)$ على D_f .

(4) عيّن القيم الحدة للدالة f .

(5) أنشئ (C_f) في معلم متعامد متجانس.



12

التمرين رتم

لنكن f الدالة المعرفة بـ: $f(x) = \frac{-x}{x^2 - 1}$ ،

(C_f) تمثيلها البياني.


(1) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $x^2 - 1 = 0$ ، ثم استنتج مجموعة تعريف الدالة f .

(2) احسب $f(0)$ ، $f(2)$ و $f(3)$.

(3) ادرس شغبة الدالة f ، فسر النتيجة بيانبا.

(4) استنتج دون حساب كلا من $f(-2)$ و $f(-3)$.

(5) إلبك في الشكل الموالي جزء من (C_f) .



أ- أكمل رسم المنحنى (C_f) على المجموعة $D = [-3; 3] - \{-1; 1\}$.

ب- شكّل جدول تغيرات الدالة f على D .

ج- لخص في جدول إشارة $f(x)$ على D .



13

التمرين رتم

I. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = x^2 + ax + b$$

حيث a و b عدنان حقيقتان، (C_f) تمثيلها البياني.

(1) عيّن قيمتي a و b علما أن (C_f) يشمل النقطتين

$A(0; 20)$ و $B(2; 8)$.

(2) نضع الآن: $f(x) = x^2 - 8x + 20$.

أ- عيّن السوابق الممكنة للعدد 20 بالدالة f .

ب- نحقق أنه لكل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = (x-4)^2 + 4$.

ج- ادرس اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين

$]-\infty; 4]$ و $[4; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

د- بين أنه لكل x من $\mathbb{R}$: $f(x) - 4 \geq 0$ ،

استنتج وجود قيمة حدية للدالة f ثم عينها.


II. نعتبر في المسنوي المثلث ABC القائم في B

حيث $AB = 4\text{ cm}$ ، $BC = 2\text{ cm}$.

M نقط من $[AB]$ حيث $AM = x$.

D و E نقطتان من المسنوي بحيث يكون الرباعي

$MCDE$ مربعا. (انظر الشكل أدناه)




(1) ما هي القيم الممكنة لـ x ؟

(2) عبر عن الطول MC بدلالة x .

(3) بين أن مساحة المربع $MCDE$ هي $f(x)$.

(4) استنتج قيمة x حتى تكون مساحة المربع $MCDE$ أصغر ما يمكن.



انزعج جميلًا ولو في غير موضعه
فلن يضيع جميل أينما نزعج

حل أسئلة مجموعة 4 على احوال - 8 م - 0

010

تعيين مجموعة تعريف f

$$\begin{aligned} x \in]-\infty; 0] & \text{ من أجل } x \leq 0 \text{ من أجل } -x \geq 0 \\ x \in [-1; +\infty[& \text{ من أجل } x \geq -1 \text{ من أجل } x+1 \geq 0 \\ \text{إذن: } D_f &=]-\infty; 0] \cap [-1; +\infty[\\ &= [-1; 0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{8} f(x) &= \sqrt{|x|+5} \quad (\text{دالة صماء}) \\ D_f &= \{x \in \mathbb{R} / |x|+5 \geq 0\} = \mathbb{R} \\ \text{لأن } |x| \geq 0 \text{ لكل } x \in \mathbb{R} \text{ ومنه } |x|+5 \geq 0 \text{ محقق لكل } x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

طريقة: دراسة اتجاه تغير f على المجال I

$$\begin{aligned} \textcircled{1} f(x) &= -\frac{3}{2}x+7 \quad ; I = \mathbb{R} \\ \text{طريقة: لدينا، عند نقطتين حقيقيتين } x_1 \text{ و } x_2 \text{ من } I \\ \text{حيث } x_1 < x_2 \text{، ثم نقارن بين } f(x_1) \text{ و } f(x_2) \\ \text{باستعمال خواص للتباين:} \end{aligned}$$

تذكر: لتغير اتجاه متباينة عند:
* الضرب في عدد سالب
* تربيع طرفين سالبين
* قلب الطرفين

$$\begin{aligned} \text{لنأخذ } x_1 \text{ و } x_2 \text{ من } \mathbb{R} \text{ حيث } x_1 < x_2 \\ \text{بالضرب في } -\frac{3}{2} \text{ نجد:} \\ -\frac{3}{2}x_1 > -\frac{3}{2}x_2 \\ -\frac{3}{2}x_1+7 > -\frac{3}{2}x_2+7 \\ f(x_1) > f(x_2) \\ \text{إذن } f \text{ متناقصة تمامًا على } \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} f(x) = 1-x^2 \quad ; I = [0; +\infty[$$

$$\textcircled{3} f(x) = 3+\sqrt{5-x} \quad ; I =]-\infty; 5]$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} f(x) &= \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{2} \quad ; I =]-\infty; \frac{1}{2}] \\ \text{ليكن } x_1 \text{ و } x_2 \text{ من } I \text{ حيث } x_1 < x_2 \leq \frac{1}{2} \\ x_1 - \frac{1}{2} < x_2 - \frac{1}{2} \leq 0 \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} f(x) = 2x + \frac{1}{x} \quad (\text{دالة نابذة})$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\} = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$$

$$\textcircled{2} f(x) = \frac{x^3-3x}{2} = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$$

$$D_f = \mathbb{R} \quad (\text{دالة كسرية حدود})$$

$$\textcircled{3} f(x) = x^2 - \sqrt{1-4x} \quad (\text{دالة صماء})$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 1-4x \geq 0\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} / x \leq \frac{1}{4}\}$$

$$=]-\infty; \frac{1}{4}]$$

$$\textcircled{4} f(x) = \frac{x-1}{x^2+3} \quad (\text{دالة نابذة})$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2+3 \neq 0\}$$

$$x^2+3=0 \text{ من أجل } x^2=-3 \text{ (مستحيل)}$$

$$\text{منه } x^2+3 \neq 0 \text{ لا تتغير على } \mathbb{R} \text{ إذن:}$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

$$\textcircled{5} f(x) = \frac{\sqrt{x}}{|x|-2}$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0 \text{ و } |x|-2 \neq 0\}$$

$$x \geq 0 \text{ من أجل } x \in [0; +\infty[$$

$$|x|-2 \neq 0 \text{ من أجل } |x| \neq 2$$

$$x \neq 2 \text{ و } x \neq -2$$

$$\text{إذن: } D_f = [0; +\infty[- \{2\}$$

$$= [0; 2[\cup]2; +\infty[$$

$$\textcircled{6} f(x) = \frac{2x+1}{x^2-9} \quad (\text{دالة نابذة})$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2-9 \neq 0\}$$

$$x^2-9 \neq 0 \text{ من أجل } x^2 \neq 9$$

$$x \neq 3 \text{ و } x \neq -3$$

$$\text{إذن: } D_f = \mathbb{R} - \{-3; 3\}$$

$$=]-\infty; -3[\cup]-3; 3[\cup]3; +\infty[$$

$$\textcircled{7} f(x) = \sqrt{-x} + \sqrt{x+4} \quad (\text{دالة صماء})$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / -x \geq 0 \text{ و } x+4 \geq 0\}$$

$$-x \geq 0 \text{ من أجل } x \leq 0$$

$$x+4 \geq 0 \text{ من أجل } x \geq -4$$

$$\text{إذن: } D_f = [-4; 0]$$

$$f(-x) = (-x)^{2021} + \frac{1}{(-x)^{2021}}$$

$$= -x^{2021} - \frac{1}{x^{2021}}$$

$$= -\left(x^{2021} + \frac{1}{x^{2021}}\right)$$

$$= -f(x)$$

اذن f فردية

④ $f(x) = x^4 - 2|x|$
 $D_f = \mathbb{R}$ وهي متناظرة بالنسبة للصفر
ولدينا $f(-x) = (-x)^4 - 2|-x| = f(x)$
اذن f زوجية

⑤ $f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 5}$, $D_f = \mathbb{R}$
 f دالة زوجية

⑥ $f(x) = \frac{3x+1}{x^2}$, $D_f = \mathbb{R}^*$
لكل $x \in \mathbb{R}^*$ فإن $-x \in \mathbb{R}^*$ ولدينا:
 $f(-x) = \frac{-3x+1}{x^2} \neq f(x)$
وكذلك $f(-x) = -\frac{3x-1}{x^2} \neq -f(x)$
اذن f ليست زوجية وليست فردية.

⑦ $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{2x^2+1}}$, $D_f = \mathbb{R}$
لكل $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$ ولدينا:
 $f(-x) = \frac{-x^3}{\sqrt{2x^2+1}} = -f(x)$
اذن f فردية

⑧ $f(x) = x - |x^2 - 1|$, $D_f = \mathbb{R}$
 D_f متناظرة بالنسبة للصفر ولدينا:
 $f(-x) = -x - |x^2 - 1| \neq f(x)$
وكذلك $f(-x) \neq -f(x)$
اذن f ليست زوجية وليست فردية

مثال ٥٠٤

(1) تبيان ان f زوجية

$D_f = \mathbb{R}$ وهي متناظرة بالنسبة لـ 0 ولدينا:

$$2f(x) + f(-x) = 3|x| - \sqrt{x^2 + 1} \quad \text{①}$$

$$2f(-x) + f(x) = 3|x| - \sqrt{x^2 + 1} \quad \text{②}$$

عوضنا بـ x

بالتربيع نجد: $(x_1 - \frac{1}{2})^2 > (x_2 - \frac{1}{2})^2$
ومنه: $(x_1 - \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{2} > (x_2 - \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{2}$
أي: $f(x_1) > f(x_2)$

اذن: f متناقصة تمامًا على $]-\infty; \frac{1}{2}]$

⑤ $f(x) = \frac{4}{x+2} - 10$; $I =]-2; +\infty[$
لكل x_1, x_2 من I حيث $-2 < x_1 < x_2$
ومنه $0 < x_1 + 2 < x_2 + 2$
بالقلب: $\frac{1}{x_1 + 2} > \frac{1}{x_2 + 2}$

ومنه: $\frac{4}{x_1 + 2} - 10 > \frac{4}{x_2 + 2} - 10$
أي: $f(x_1) > f(x_2)$

اذن: f متناقصة تمامًا على $]-2; +\infty[$

⑥ $f(x) = \frac{-1}{\sqrt{x-3}}$; $I =]3; +\infty[$
لكل x_1, x_2 من I حيث $3 < x_1 < x_2$
ومنه $0 < x_1 - 3 < x_2 - 3$
بجذر الطرفين: $\sqrt{x_1 - 3} < \sqrt{x_2 - 3}$
بالقلب: $\frac{1}{\sqrt{x_1 - 3}} > \frac{1}{\sqrt{x_2 - 3}}$
نضرب في -1: $\frac{-1}{\sqrt{x_1 - 3}} < \frac{-1}{\sqrt{x_2 - 3}}$
أي: $f(x_1) < f(x_2)$

اذن f متزايدة تمامًا على $]-3; +\infty[$

٣٣ : دراسة شغوية f

① $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$, $D_f = \mathbb{R}^*$
لكل $x \in \mathbb{R}^*$ فإن $-x \in \mathbb{R}^*$ ولدينا:
 $f(-x) = \frac{(-x)^2 + 1}{-x} = -\frac{x^2 + 1}{x} = -f(x)$
اذن: f فردية

② $f(x) = \sqrt{x^2 + 2020}$, $D_f = \mathbb{R}$
لكل $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$ ولدينا:
 $f(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 2020} = f(x)$
اذن f زوجية

③ $f(x) = x^{2021} + \frac{1}{x^{2021}}$, $D_f = \mathbb{R}^*$
لكل $x \in \mathbb{R}^*$ فإن $-x \in \mathbb{R}^*$ ولدينا:

(2)

(3) سوابق العدد 0 بالدالة f :
 هي حلول المعادلة $f(x)=0$
 $3 - \frac{1}{x+1} = 0$ أي :
 $\frac{3x+2}{x+1} = 0$ يكافئ :
 $x+1 \neq 0$ و $3x+2=0$ " "
 $x = -\frac{2}{3}$ "

للمعادلة السابقة وحيدة بالدالة f هي $-\frac{2}{3}$
 (4) لتحسين قسمة α و β :

$f(\alpha) = 4$ معنا $A(x; u) \in (E_f)$
 (نبحث عن سوابق 4 بالدالة f)

المعادلة تكافئ : $3 - \frac{1}{\alpha+1} = 4$

يكافئ : $-1 - \frac{1}{\alpha+1} = 0$

" $\frac{-\alpha-2}{\alpha+1} = 0$

" $- \alpha - 2 = 0$ و $\alpha + 1 \neq 0$

لذن : $\boxed{\alpha = -2}$

$f(5) = \beta$ معنا $B(5; \beta) \in (E_f)$

أي β هي صورة 5 بالدالة f ومنه

$$\beta = 3 - \frac{1}{5+1} = 3 - \frac{1}{6}$$

لذن $\boxed{\beta = \frac{17}{6}}$

(5) اتجاه تحسين f :

على المجال $]-1; +\infty[$

لكن x_1 و x_2 عددين حقيقيين من المجال

$]-1; +\infty[$ حيث $x_1 < x_2 < -1$

ومنه : $x_1 + 1 < x_2 + 1 < 0$

بالقلب : $\frac{1}{x_1+1} > \frac{1}{x_2+1}$

بالضرب في -1 : $-\frac{1}{x_1+1} < -\frac{1}{x_2+1}$

ومنه : $3 - \frac{1}{x_1+1} < 3 - \frac{1}{x_2+1}$

أي $f(x_1) < f(x_2)$

لذن f متزايدة تمامًا على $]-1; +\infty[$

بطريقة مماثلة نجد ان f متزايدة تمامًا على $]-\infty; -1[$

جدول التغيرات :



بسطح (2) من (1) نجد :

$$f(x) - f(-x) = 0$$

ومنه : $f(-x) = f(x)$

لذن f زوجية

* استنتاج عبارة $f(x)$ بدلالة x :

لدينا : $2f(x) + f(-x) = 3|x| - \sqrt{x^2+1}$

ومنه :

$$3f(x) = 3|x| - \sqrt{x^2+1}$$

لذن : $f(x) = \frac{3|x| - \sqrt{x^2+1}}{3}$

(2) تبيان أن g دالة فردية :

$D_g = \mathbb{R}$ وهي متناظرة بالنسبة لـ 0 ،

ولدينا : $3g(-x) + g(x) = x^3 + 4x$... (1)

ومنه : $3g(x) + g(-x) = -x^3 - 4x$... (2)

عوضنا بـ $-x$

بجمع (1) و (2) نجد :

$$4g(-x) + 4g(x) = 0$$

ومنه : $g(-x) = -g(x)$

لذن g فردية

* استنتاج عبارة $g(x)$ بدلالة x :

لدينا : $3g(-x) + g(x) = x^3 + 4x$

ومنه : $-3g(x) + g(x) = x^3 + 4x$

لذن : $g(x) = -\frac{x^3 + 4x}{2}$

$$f(x) = 3 - \frac{1}{x+1}$$

(1) تعيين D مجموعة تعريف f :

f معرفة إذا وفقط إذا كان $x+1 \neq 0$

أي $x \neq -1$ لذن :

$$D = \mathbb{R} - \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

(2) حساب الصور :

$$f(0) = 2, f(-10) = \frac{28}{9}$$

$$f(7) = \frac{23}{8}, f(\sqrt{3}) = 3 - \frac{1}{\sqrt{3}+1} = \frac{3\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}+1}$$

حل بيانيا المعادلات والمتراجحات :

$f(x) + 1 = 0$ تكافئ $f(x) = -1$
 حلول هذه المعادلة بيانيا هي فواصل نقاط
 تقاطع (ع) مع المستقيم ذي المعادلة $y = -1$
 $S = \{-2; 2\}$

$g(x) > 0$: حلول هذه المتراجحة بيانيا هي
 فواصل (و) الواقعة فوق محور الفواصل مع
 فواصل نقاط التقاطع : $S = [-3; -1] \cup [1; 3]$
 $g(x) < f(x)$: حلول هذه المتراجحة بيانيا
 هي فواصل (و) الواقعة تحت (ع)
 $S =]1; 1[$
 $f(x) = g(x)$: حلول هذه المعادلة بيانيا
 فواصل النقاط المشتركة بين (ع) و (و)
 $S = \{-1; 1\}$

(5) استنتاج (ع)

(استعين بحل مساعد)

(6) حلول المتراجحة $f(x) + 3 > 0$

تكافئ : $f(x) > -3$

حلول هذه المتراجحة بيانيا هي فواصل

(ع) الواقعة فوق المستقيم ذي

المعادلة $y = -3$

إذن : $S =]-2; 6[$

التكديريا :

$f(x) = \begin{cases} -x+3 & ; x \geq 0 \\ 3x+3 & ; x \leq 0 \end{cases}$

$f(x) > -3$ تكافئ :

$\begin{cases} -x+3 > -3 & ; x \geq 0 \\ 3x+3 > -3 & ; x \leq 0 \end{cases}$

$\begin{cases} x < 6 & ; x \geq 0 \\ x > -2 & ; x \leq 0 \end{cases}$

ومنه : $x \in [0; 6[\cup]-2; 0]$

إذن : $S =]-2; 6[$

تدريبات

(1) كتابة $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة :
 $|x| = \begin{cases} x & ; x \geq 0 \\ -x & ; x \leq 0 \end{cases}$

ومنه : $f(x) = \begin{cases} -x+3 & ; x \geq 0 \\ 3x+3 & ; x \leq 0 \end{cases}$

(2) حل المعادلة $f(x) = 0$

تكافئ : $-x+3=0$ مع $x \geq 0$

أو $3x+3=0$ مع $x \leq 0$

ومنه : $x=3$ (مقبول)
 أو $x=-1$
 إذن : $S = \{-1; 3\}$

التفسير البياني :

$(f) \cap (xx) = \{(-1; 0); (3; 0)\}$

(3) اتجاه تغير f :

f متزايدة فاما على المجال $]-\infty; 0]$

فمتناقص $]0; +\infty[$

جدول التغير :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$		3	

(4) من جدول التغير : نستنتج ان 3 قيمة
 حدية كبرى للدالة f عند 0 .

(5)

تدريبات

(1) بقراءة بيانية :

أ - $D_f = [-1; 4]$ ، $f(0) = 3$ ، $f(-1) = 8$ ، $f(1) = 0$

ب - سوابق العدد بالدالة f هي 1 و 3 .

ج - جدول تغيرات f :

x	-1	2	4
$f(x)$	8	-1	3

ح - حلول المتراجحة $f(x) > 0$ بيانيا هي فواصل
 النقاط الواقعة فوق محور الفواصل
 $S = [-1; 1[\cup]3; 4]$

(2) علما أن : $f(x) = ax^2 + bx + c$

أ - $f(0) = c$ ، $f(1) = a + b + c$ ، $f(-1) = a - b + c$

ب - تعيين قيم a ، b ، c :
 $c = 3$ ومنه : $f(0) = 3$
 $a + b + 3 = 0$ ومنه : $f(1) = 0$
 $-b + 3 = 8$ ومنه : $f(-1) = 8$

