



لإبراز العلاقة بين المبيضين والغدة النخامية نقدم لك المعطيات التالية :
تمثل الوثيقة (1) بنيات مبيضية ملاحظة بالمجهر خلال دورة جنسية بـ 28 يوما.



الوثيقة 1

- 1 - سم الاشكال الممثلة في الوثيقة (1).
- 2 - رتب هذه البنى وفق التسلسل الزمني لظهورها.

لدراسة تأثير المبيض على الغدة النخامية ، نجري سلسلة من التجارب على انثى قرد المكاك :
التجربة 1 : نزع المبيض
التجربة 2 : حقن الاستيرجينيئات بتركيز متزايدة ؛ الجرعات تبقى أقل من 300 pg/m .
 (1pg = 10⁻⁹ g)
التجربة 3 : حقن الاستيرجينيئات بجرعات أكبر من 300 pg/m .
التجربة 4 : حقن البروجسترون .
 التأثيرات على مستوى انتاج هرمون LH ممثلة في الوثيقة (2)
 3- ماهي المعلومات المستخرجة من تحليلك لنتائج الوثيقة 2 ؟



الوثيقة 2

4 - بالاستعانة بالمعارف التي توصلت إليها ومعلوماتك المكتسبة ، اكمل الجدول التالي بعد نقله على ورقة إجابتك.

البنيات	نوع المراقبة الرجعية	التعليق
البنية F		
البنية G		
البنية C		

التصحيح

العلامة		عناصر الاجابة						
كاملة	مجزأة							
3.5ن	7X0.5	1 – تسمية الاشكال الممثلة في الوثيقة 1 :						
		A	B	C	D	E	F	G
		جريب ثانوي	جريب أولي	جسم أصفر	جريب ابتدائي	انفجار الجريب وتحرير البويضة	جريب اجوف	جريب دوغراف (ناضج)
3.5ن	7X0.5	2 – ترتيب البنيات المبيضية وفق التسلسل الزمني لظهورها :						
		1	2	3	4	5	6	7
		B	D	A	F	G	E	C
6ن	4X0.5	3 – المعلومات المستخرجة من تحليل نتائج الوثيقة 2 : التحليل :						
		التجربة 1 : استئصال المبيضان أدى إلى ارتفاع كبير في تركيز LH من القيمة 10ng/ml إلى قيمة قصوى تقدر بـ 50ng/ml. التجربة 2 : الحقن المتزايد وبتراكيز منخفضة من الاستيروجينات أدى إلى انخفاض في تركيز LH المفرزة من القيمة 50ng/ml على قيمة دنيا تقدر بـ 10ng/ml. التجربة 3 : الحقن المتزايد وبتراكيز مرتفعة من الاستيروجينات أدى إلى ارتفاع سريع في تركيز LH من القيمة 10ng/ml إلى قيمة قصوى تقدر بـ 60ng/ml. التجربة 4 : حقن البروجستيرون أدى الى انخفاض افراز LH إلى أقل من 10ng/ml						
6ن	4X01	المعلومات المستخرجة:						
		من التجربة 1 :المبيض يمارس مراقبة رجعية سلبية على إفراز LH (كبح او تثبيط). من التجربة 2 : التركيز الضعيفة من الاستيروجينات تمارس مراقبة رجعية سلبية على إفراز LH. من التجربة 3 : التركيز المرتفعة من الاستيروجينات تمارس مراقبة رجعية إيجابية على إفراز LH. من التجربة 4 : البروجيستيرون يمارس مراقبة رجعية سلبية على إفراز LH.						
6ن	6X01	4 – تكمل الجدول :						
		البنيات		نوع المراقبة الرجعية		التعليل		
		البنية F		مراقبة رجعية سلبية		افراز تراكيز ضعيفة من الاستيروجينات		
		البنية G		مراقبة رجعية موجبة		افراز تراكيز مرتفعة من الاستيروجينات		
		البنية C		مراقبة رجعية سلبية		افراز البروجيستيرون		