

ثانوية مالك بن نبي الخاصة (باتنة)

الجزع المشترك : علوم وتكنولوجيا

ملف

القيمة المطلقة – المسافة – المجالات

كراس التدرّيات


إعداد: الأستاذ شيخ عبد الحميد

المفهوم البياني أو الهندسي للقيمة المطلقة والمسافة بين عددين حقيقيين

تذكير :

(Δ) مستقيم مدرج ومزود بمعلم ($O; I$)

نعلم - على سبيل المثال - النقطتين A و B ذات الفاصلتين (-5) و (7) على الترتيب .



بيانيا أو هندسيا :

- المسافة بين العددين (-5) و (7) والتي يرمز لها بالرمز $d(-5;7)$ أو $d(7;-5)$ هي المسافة بين النقطتين A و B . $d(-5;7) = d(7;-5) = AB$.
- القيمة المطلقة لفرق العددين (-5) و 7 والتي يرمز لها بالرمز $|-5-7|$ أو $|7-(-5)|$ نفسها المسافة بين العددين (-5) و (7) اي بين النقطتين A و B . $|-5-7| = d(-5;7) = AB$.
- بيانيا : $d(-5;7) = |-5-7| = AB = 12$
- وعموما : من أجل كل عددين حقيقيين x و y :
(الناتج هو الفرق بين أكبر العددين وأصغرهما) $|x-y| = |y-x| = d(x;y) = d(y;x) = M_1M_2$

تمرين 1 :

فسر بيانيا كلا مما يلي :

$$d(0;6) ; d(-1;-2) ; d(5;3)$$

$$|3-7| ; |8| ; \left|\frac{1}{2}+4\right|$$

تمرين 3 :

عبر عن كل مما يلي بواسطة المسافة :

$$\left|-\sqrt{3}+3\right| ; \left|\sqrt{2}+2\right| ; \left|\frac{2}{3}-1\right|$$

تمرين 2 :

فسر بيانيا كلا ما يلي :

كل حالة من الحالات الآتية قيم العدد الحقيقي

x

1 . $|x+1|=3$ (.

2 . $|x-4|=2$ (.

3 . $|x|=5$ (.

تمرين 4 :

جد ناتج كلا مما يلي :

$$d\left(1;\frac{5}{7}\right) ; \left|\frac{3}{4}-\frac{2}{3}\right| ; |3-7| ; d(3;8)$$

تمرين 5 :

عين في كل حالة من الحالات الآتية قيم العدد الحقيقي x إن وجدت (استعن بالمستقيم العددي)

1 . $d(x;3)=4$ (.

2 . $d(-5;x)=-1$ (.

3 . $d(x;-1)=0$ (.

تمرين 6 :

في كل مما يلي ؛ ترجم القيمة المطلقة إلى مسافة ثم معتمدا على التمرين 5 ؛ عين في

كتابة عبارة جبرية دون رمز القيمة المطلقة

تذكير :

تعريفًا لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x وبالتالي لكتابة عبارة دون رمز القيمة المطلقة
لا بد أولاً من تحديد إشارة هذه العبارة ثم تطبيق التعريف

$$|x| = \begin{cases} -x & ; x \leq 0 \\ x & ; x \geq 0 \end{cases}$$

1 .) العبارة لا تشمل متغيراً x

مثال 1 :

نكتب دون رمز القيمة المطلقة : $|3\sqrt{5} - 4\sqrt{3}|$.

نحدد إشارة $(3\sqrt{4} - 4\sqrt{3})$ أي ننظر إن كان

العدد $(3\sqrt{5} - 4\sqrt{3})$ موجبا أم سالبا .

لدينا :

$$\begin{cases} (3\sqrt{5})^2 = 45 \\ (4\sqrt{3})^2 = 48 \end{cases} \quad \text{نلاحظ أن : } (3\sqrt{5})^2 < (4\sqrt{3})^2$$

ينتج عن هذا : $3\sqrt{5} < 4\sqrt{3}$ وبالتالي :

$$(3\sqrt{5} - 4\sqrt{3}) < 0$$

نطبق التعريف

$$\begin{aligned} \text{إذا : } |3\sqrt{5} - 4\sqrt{3}| &= -(3\sqrt{5} - 4\sqrt{3}) \\ &= 4\sqrt{3} - 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

2 .) العبارة تشمل متغيراً x

مثال 2 :

أكتب دون رمز القيمة المطلقة $|2x - 3|$ حيث x عدد حقيقي .

ندرس إشارة $(2x - 3)$.

نقوم مثلاً بالحل في $\mathbb{R}$ للمراجعة $2x - 3 \geq 0$

$$2x - 3 \geq 0 \quad \text{يكافئ} \quad 2x \geq 3$$

$$\text{يكافئ} \quad x \geq \frac{3}{2}$$

نمثل هذه الإشارة في جدول

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$2x - 3$	-	0	+

الجدول السابق يلخص ما يلي :

$$\begin{cases} 2x - 3 \leq 0 \text{ معناه } x \leq \frac{3}{2} \text{ أي } x \in \left] -\infty; \frac{3}{2} \right] \\ 2x - 3 \geq 0 \text{ معناه } x \geq \frac{3}{2} \text{ أي } x \in \left[\frac{3}{2}; +\infty \right[\end{cases}$$

في هذه الحالة نكتب :

$$|2x - 3| = \begin{cases} -(2x - 3) & ; x \in \left] -\infty; \frac{3}{2} \right] \\ (2x - 3) & ; x \in \left[\frac{3}{2}; +\infty \right[\end{cases}$$

مثال 3 :

نكتب العبارة $A(x) = |-2x + 1| - |x - 3|$ دون رمز القيمة المطلقة .

نحدد إشارة كل من $(2x + 1)$ و $(x - 3)$

$$\bullet \quad -2x + 1 \geq 0 : x \in \mathbb{R} \quad \text{معناه} \quad -2x \geq -\frac{1}{2}$$

$$\text{معناه} \quad x \leq \frac{1}{2}$$

إشارة $(-2x + 1)$ ممثلة في الجدول الآتي :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$-2x + 1$	-	0	+

$$\bullet \quad x - 3 \geq 0 : x \in \mathbb{R} \quad \text{يكافئ} \quad x \geq 3$$

إشارة $(x - 3)$ كما يلي :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$x - 3$	-	0	+

نستعمل جدولاً مماثلاً للجدول الموالي

نستنتج من خلاله إشارة $A(x)$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
$ -2x+1 $	$-2x+1$	0	$2x-1$	$2x-1$
$ x-3 $	$-x+3$	$-x+3$	0	$x-3$
$ -2x+1 - x-3 $	$-x-2$	$\frac{5}{2}$	$3x-4$	$x+2$

وهذا معناه :

$$|-2x+1|-|x-3| = \begin{cases} -x-2 ; & x < \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} ; & x = \frac{1}{2} \\ 3x+4 ; & x \in \left] \frac{1}{2}; 3 \right[\\ 5 ; & x = 3 \\ x+2 ; & x > 3 \end{cases}$$

تمرين 1 :

أكتب دون رمز القيمة المطلقة $\left| \frac{3}{2} - \sqrt{7} \right|$.

تمرين 4 :

x و y عدداً من المجال $[1; 2]$.

1. عین إشارة كل من $(x+2y)$ و $(2x-y)$.

2. بسط العبارة A حيث :

$$A = |-2x-y| + |y+2x| - x + 3y$$

تمرين 2 :

أكتب على أبسط شكل كل عبارة من العبارتين

A و B .

$$A = |2\sqrt{5}-19| - 2|3-\sqrt{5}| + |-7-\sqrt{2}| - |\sqrt{2}+7|$$

$$B = |3\sqrt{2}-2\sqrt{3}| - \sqrt{2}|2\sqrt{2}-3| - 2|2-\sqrt{3}| + |-1|$$

$$A(x) = |x - \sqrt{2}| + |-x + 3|$$

$$B(x) = 2|3x + 4| - 2|x + 1|$$

تمرين 5 :

x عدد حقيقي

1 . أدرس إشارة $(x+1)$

2 . استنتج كتابة $|x+1|$ دون رمز القيمة المطلقة

تمرين 6 :

أكتب دون رمز القيمة المطلقة كلا ممن الأعداد الآتية حيث x عدد حقيقي .

$$|-x+4| ; \left| \frac{1}{2}x+2 \right| ; \left| \frac{4}{5}-x \right|$$

تمرين 7 :

مستعينا بالمثال 3 أكتب كلا من العبارتين $A(x)$ و $B(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

المعادلتان في $\mathbb{R}$: $|x+a|=k$ و $|x+a|+|x+b|=k$

حيث a و b عددين حقيقيين كفيان و k عدد حقيقي موجب تماما

تذكير و ملاحظة



حيث A و B النقطتان ذات الفاصلتين (-2) و 6 على الترتيب.

• $AB = d(-2;6) = 8$

• لتكن M نقطة متحركة (متغيرة) على المستقيم العددي فاصلتها x يمكن استنتاج موضعين للنقطة M

• $MA + MB = 8$ أي $d(x;-2) + d(x;6) = 8$ في هذه الحالة : $x \in [-2;6]$ أي $M \in [AB]$

أي $|x+2| + |x-6| = 8$

• $MA + MB > 8$ أي $|x+2| + |x-6| > 8$ ينتج عن هذا : $x \notin [-2;6]$ أي $M \notin [AB]$

معناه $|x+3|=4$ معناه $|x+3|=4$
معناه $x+3=4$ أو $x+3=-4$
معناه $x=1$ أو $x=-7$
 $S = \{-7;1\}$

مثال 2 .

نحل في $\mathbb{R}$ المعادلة $|x-2| + |x+6| = 8$


الطريقة البيانية

معناه $|x-2| + |x+6| = 8$ أي $d(x;2) + d(x;-6) = 8$

على المستقيم العددي نعلم النقطتين

$A(-6)$ و $B(2)$.

ولتكن M النقطة ذات الفاصلة x



لدينا :

من جهة :

$d(x;2) + d(x;6) = 8$ معناه $MB + MA = 8$

من جهة أخرى : $AB = d(-2;6) = 8$.

إذا : $MA + MB = AB$ معناه $MA + MA = 8$

ما هو موضع النقطة M على المستقيم العددي؟

M نقطة من قطعة المستقيم $[AB]$ أي

$x \in [-6;2]$

مثال 1 :

نعين مجموعة الأعداد الحقيقية x (اي نحل

في $\mathbb{R}$ المعادلة) التي تحقق : $|x+3|=4$.

الطريقة البيانية أو الهندسية .

نترجم المسافة إلى قيمة مطلقة :

معناه $|x+3|=4$ أي $|x-(-3)|=4$

معناه $d(x;-3)=4$.

على المستقيم العددي نعلم النقطة ذات


الفاصلة (-3) ولتكن A .

نفرض أن x هو فاصلة نقطة M .

في الحالة : $d(x;-3)=4$ يكافئ $MA=4$.

نبحث عن موضع النقطة M على (Δ) حيث

$MA=4$



بيانيا يوجد موضعان للنقطة M وهما :

M_1 ذات الفاصلة (-1) و M_2 ذات الفاصلة (7)

وعليه : إذا كانت هي S مجموعة حلول

المعادلة فإن : $S = \{-7;1\}$.

الطريقة الجبرية .

نعتمد أساسا على العلاقة $|X|=|Y|$ والمكافئة

$(X=Y)$ أو $(X=-Y)$

إذا :

الطريقة الجبرية

1. نكتب المجموع $|x-2|+|x+6|$ دون رمز القيمة المطلقة.

$$x \in \mathbb{R}^* : x-2 \geq 0 \text{ معناه } x \geq 2$$

وبالتالي :

$$|x-2| = \begin{cases} -x+2 & ; x \leq 2 \\ x-2 & ; x \geq 2 \end{cases}$$

$$x \in \mathbb{R}^* : x+6 \geq 0 \text{ يكافئ } x \geq -6$$

في هذه الحالة :

$$|x+6| = \begin{cases} -x-6 & ; x \leq -6 \\ x+6 & ; x \geq -6 \end{cases}$$

* نستعين بالجدول الآتي :

x	$-\infty$	-6	2	$+\infty$
$ x-2 $	$-x+2$	$-x+2$	$x-2$	
$ x+6 $	$-x-6$	$x+6$	$x+6$	
$ x-2 + x+6 $	$-2x-4$	8	$2x+4$	

من خلال الجدول يتضح ما يلي :

$$|x-2|+|x+6| = \begin{cases} -2x-4 & ; x \in]-\infty; -6] \\ 8 & ; x \in [-6; 2] \\ 2x+4 & ; x \in [2; +\infty[\end{cases}$$

إذا كانت S هي مجموعة الحلول فإنّ :
 $S = [-6; 2]$

مثال 3 :

نحل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $|x+2|+|x-5|=11$

• الطريقة الهندسية :


$$|x+2|+|x-5|=11 \text{ معناه } d(x, -2) + d(x, 5) = 11$$

*

$$MA + MB = 11 \text{ معناه}$$

حيث $A(-2)$ و $B(5)$ نقط من

المستقيم العددي .



$$AB = d(-2; 5) = 7 \text{ فإنّ } M \notin [AB]$$

(لكون $MA + MB = 11 > 7$) .

نميز حالتين :

* M نقطة من نصف المستقيم الذي مبدأه A والذي لا يشمل النقطة B

ينتج :

$$MA + (MA + AB) = 11 \text{ معناه } MA + MB = 11$$

$$2MA + 7 = 11 \text{ معناه}$$

$$MA = 2 \text{ معناه}$$

في هذه الحالة الفاصلة x لـ M هي $x = -4$

* M نقطة من نصف المستقيم الذي مبدأه B

والذي لا يشمل النقطة A

ينتج :

$$MA + MB = 11 \text{ معناه } MB + (MB + AB) = 11$$

$$2MB + 7 = 11 \text{ معناه}$$

$$MB = 2 \text{ معناه}$$

في هذه الحالة الفاصلة x لـ M هي $x = 7$

* خلاصة :

إذا كانت S هي مجموعة حلول المعادلة

$$S = \{-4; 7\}$$

الطريقة الجبرية :

نكتب المجموع $|x+2|+|x-5|$ دون رمز القيمة

المطلقة .

يمكن التأكد من صحة النتائج الواردة في هذا

الجدول :

x	$-\infty$	-2	5	$+\infty$
$ x+2 $	$-x-2$	$x+2$	$x+2$	
$ x-5 $	$-x+5$	$-x+5$	$x-5$	
$ x+2 + x-5 $	$-2x+3$	7	$2x-3$	

* نعتمد على الجدول لإيجاد الحلول :

$$1. (x \in]-\infty; -2[$$

$$|x+2|+|x-5|=11 \text{ معناه } -2x+3=11$$

$$\text{معناه } -2x=8$$

$$\text{معناه } x=-4$$

$$2. (x \in [-2; 6]$$

المعادلة لا تقبل حلولاً .

$$3. (x \in]5; +\infty[$$

$$|x+2|+|x-5|=11 \text{ معناه } 2x-3=11$$

$$\text{معناه } 2x=14$$

$$\text{معناه } x=7$$

تمرين 1 :

حل في $\mathbb{R}$ بياناً ثم جبرياً المعادلة : $|x-4|=1$.

.....

تمرين 2 :

نفس عمل التمرين الأول : $|2x-6|=3$

تمرين 4 :

حل بيانيا في $\mathbb{R}$ المعادلتين (1) و (2) :
(1) ... $|x-3|=4$ ؛ (2) ... $|x+3|=1$

تمرين 3 :

- x عدد حقيقي .
- 1 . ادرس إشارة كل من $|x-2|$ و $|x+1|$.
 - 2 . مستعينا بجدول ؛ أكتب المجموع $|x+1|+|x-2|$ دون رمز القيمة المطلقة
 - 3 . حل بعد ذلك في $\mathbb{R}$ المعادلة $|x+1|+|x-2|=5$

تمرين 5 :

حل في $\mathbb{R}$ وبالطريقة المناسبة لك كل معادلة
من المعادلات (1) ؛ (2) و (3) :

$$(1) \dots \left| x + \frac{1}{2} \right| = 4$$

$$(2) \dots |x - 4| - |x + 3| = 0$$

$$(3) \dots |x + 1| + |x + 3| = 5$$


القيمة المطلقة والمتباينات - والمسافة - والمجالات

تذكير :

ليكن r عددا حقيقيا موجبا و c عددا حقيقيا كيفيا.
 للقضايا (1) : (2) : (3) و (4) نفس المعنى
 (1) $|x-c| \leq r$
 (2) $d(x;c) \leq r$
 (3) $-r \leq x-c \leq r$
 (4) $x \in [c-r; c+r]$ أي $c-r \leq x \leq c+r$

• ليكن $[a;b]$ مجالا من $\mathbb{R}$.
 العناصر المميزة لهذا المجال هي الطول l
 نصف القطر r والمركز c .
 لدينا :

$$c = \frac{b+a}{2} \text{ و } r = \frac{l}{2} ; l = b-a$$



مثال 1 :

ليكن المجال $[-3;5]$.
 نعين الطول l ؛ المركز c ونصف القطر r لهذا المجال.
 لدينا :

$$l = 5 - (-3) = 8$$

$$c = \frac{5 + (-3)}{2} = 1$$

$$r = \frac{l}{2} = 4$$

مثال 2 :

نعين مجموعة الأعداد الحقيقية x التي من أجلها يكون : $|x+1| \leq 3$

■ الطريقة الجبرية :

$$-3 \leq x+1 \leq 3 \text{ معناه } |x-1| \leq 3$$

$$\text{معناه } -4 \leq x \leq 2$$


وبالتالي : $x \in [-4;2]$

لاحظ أن الطول والمركز ونصف القطر للمجال $[-4;2]$ هم على الترتيب : 6 و (-1) و 3

■ الطريقة الهندسية :

لدينا ما يلي :

$$|x+1| \leq 3 \text{ معناه } d(x;-1) \leq 3$$



يكفي أخذ مجال مركزه $(c=-1)$ ونصف قطره $(r=2)$.

بياننا هذا المجال هو المجال $[-4;2]$.

وبالتالي :

$$|x+1| \leq 2 \text{ معناه } x \in [-4;2]$$

مثال 3 :

ليكن x عددا حقيقيا حيث : $x \in [-1;5]$ أي $-1 \leq x \leq 5$.

نعبّر عن انتماء x إلى المجال $[-1;5]$ بواسطة قيمة مطلقة

$$\text{معناه إيجاد علاقة من الشكل } |x-c| \leq r$$

حيث : c مركز المجال $[-1;5]$ و r نصف قطره .

تعريفا لدينا :

$$c = \frac{5 + (-1)}{2} = 2 ; r = \frac{5 - (-1)}{2} = 3$$

وبالتالي :

$$|x-2| \leq 3 \text{ معناه } x \in [-1;5]$$

من (1) و (2) نستنتج أنّه إذا كانت S هي مجموعة حلول المتراجحة فإنّ :
 $S =]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[$

تمرين 1 :

عين المركز و نصف القطر للمجال $[a; b]$ في الحالتين الآتيتين M
 1. $a = 2$ و $b = 7$
 2. $a = -\frac{1}{2}$ و $b = 8$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تمرين 2 :

a عدد حقيقي حيث $a < 7$
 عين العدد الحقيقي a إذا علمت أن طول المجال $[a; b]$ يساوي 10 .

.....

.....

.....

.....

.....

تمرين 3

a و b حقيقيان حيث : $a \leq b$
 نعلم أن نصف قطر المجال $[a; b]$ يساوي 2
 وأن طوله يساوي 4 .
 عين العددين الحقيقيين a و b

.....

.....

.....

.....

مثال 4 :

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $|x-3| > 2$ اي عين مجموعة الأعداد الحقيقية x التي من أجلها يكون $|x-3| > 2$

• الطريقة البيانية


نترجم القيمة المطلقة إلى مسافة

$$|x-3| > 2 \text{ يكافئ } d(x; 3) > 2$$

على المستقيم العددي نعلم النقطة $A(3)$.

ولتكن $M(x)$ نقطة متغيرة على هذا المستقيم

$$d(x; 3) > 2 \text{ معناه } MA > 2$$



بياننا النقطة M لا تنتمي إلى قطعة المستقيم التي منتصفها النقطة $A(3)$.

وعليه :

$$|x-3| > 2 \text{ معناه } (x \in]-\infty; 1[) \text{ أو } (x \in]5; +\infty[) .$$

• الطريقة الجبرية

** نكتب $|x-3|$ دون رمز القيمة المطلقة

لهذا نبدأ بتعيين إشارة $(x-1)$

$$x \in \mathbb{R} : x-3 \geq 0 \text{ معناه } x \geq 3$$

إشارة $(x-3)$ ممثلة في الجدول الآتي

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$x-3$	-	0	+

إذا :

$$|x-3| = \begin{cases} -x+3 & ; x \in]-\infty; 3[\\ x-3 & ; x \in [3; +\infty[\end{cases}$$

حل المسألة يرجع إذا إلى حل متراجحتين

$$1. (x \in]-\infty; 3[)$$

$$|x-3| > 2 \text{ معناه } -x+3 > 2$$

$$\text{معناه } -x > -1$$

$$\text{معناه } x < 1$$

$$\text{أي } x \in]-\infty; 1[\dots (1)$$

$$2. (x \in [3; +\infty[)$$

$$|x-3| > 2 \text{ يكافئ } x-3 > 2$$

$$\text{يكافئ } x > 5$$

$$\text{أي } x \in [5; +\infty[\dots (2)$$

تمرين 6 :

انقل ثم اكمل الجدول الآتي :

المجال	الحصر	المسافة	القيمة المطلقة
$[2;8]$	$2 \leq x \leq 8$	$d(x;5) \leq 3$	$ x-5 \leq 3$
			$ x-1 < 2$
			$ x+7 \leq 2$
			$ x-2 < 1$

تمرين 4 :

حل جبريا ثم بيانيا في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المتراجحة : $|x+1| \leq 4$

تمرين 5 :

حل في $\mathbb{R}$ وبالطريقة الجبرية المتراجحة : $|x+2| \geq 4$

تمرين 7 :

نفس عمل التمرين رقم 6

القيمة المطلقة	المسافة	الحصر	المجال
$ x-2 \leq 1$			
	$d(x, -3) < 5$		
		$3 \leq x \leq 7$	
			$x \in]-2; 3[$

تمرين 9 :1 . عين مجموعة الأعداد الحقيقية x في

الحالتين (1) و (2)

(1) $|x+1| \leq 5$ ؛ (2) $|x+1| \geq 3$.2 . استنتج مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث

$$3 \leq |x+1| \leq 5$$

تمرين 8 :عين مجموعة الأعداد الحقيقية x في الحالتين1 . $|x+3| < 2$.2 . $-2|x+1| \leq -6$

الحل الجبري لمعادلات ومتراجحات تشمل القيمة المطلقة

مثال 1 :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $|2x+1|-|x+3|=1$... (1)

الفكرة هي كتابة الفرق $|2x+1|-|x+3|$ دون رمز القيمة المطلقة.

كيف ؟

1) نحدد إشارة كل من $(2x+1)$ و $(x+3)$

2) نعتمد على هذه الإشارة ونستعين بجدول

لكتابة $|2x+1|-|x+3|$ دون الرمز $||$.

3 .) نميز (أو نفصل) الحالات من خلال الجدول .

1 .) نحدد إشارة $(2x+1)$

$$x \in \mathbb{R} ; 2x+1 \geq 0 \text{ معناه } x \geq -\frac{1}{2}$$

وبالتالي :

$$|2x+1| = \begin{cases} -2x-1 & ; x \in]-\infty; -\frac{1}{2}] \\ 2x+1 & ; x \in [-\frac{1}{2}; +\infty[\end{cases}$$

وبالمثل :

$$x \in \mathbb{R} ; x+3 \geq 0 \text{ معناه } x \geq -3$$

في هذه الحالة :

$$|x+3| = \begin{cases} -x-3 & ; x \in]-\infty; -3] \\ x+3 & ; x \in [-3; +\infty[\end{cases}$$

2 .) نستنتج كتابة $|2x+1|-|x+3|$ دون رمز

القيمة المطلقة من خلال الجدول الآتي :

x	$-\infty$	-3	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$ 2x+1 $	$-2x-1$	$-2x-1$	0	$2x+1$
$ x+3 $	$-x-3$	0	$x+3$	$x+3$
$ 2x+1 - x+3 $	$-x+2$	$-3x-4$	$\frac{5}{2}$	$x-2$

من خلال الجدول يتضح ما يلي :

كل من (-3) و $(\frac{1}{2})$ ليس حلا للمعادلة

▪ نبحث عن حلول المعادلة في كل من

$$\text{المجالات }]-\infty; -3] ;]-\frac{1}{2}; +\infty[\text{ و }]-\frac{1}{2}; +\infty[.$$

$$x \in]-\infty; -3]$$

$$|2x+1|-|x+3|=1 \text{ معناه } -x+2=1$$

$$\text{معناه } x=1$$

هذا الحل مرفوض : $1 \notin]-\frac{1}{2}; +\infty[$.

$$x \in]-\frac{1}{2}; +\infty[$$

$$|2x+1|-|x+3|=1 \text{ يكافئ } -3x-4=1$$

$$\text{يكافئ } x=-\frac{5}{3}$$

$$\text{هذا الحل مقبول : } -\frac{5}{3} \in]-\frac{1}{2}; +\infty[$$

$$x \in]-\frac{1}{2}; +\infty[$$

$$|2x+1|-|x+3|=1 \text{ معناه } x-2=1$$

$$\text{معناه } x=3$$

$$\text{هذا الحل مقبول : } 3 \in]-\frac{1}{2}; +\infty[$$

مما سبق نستنتج أن للمعادلة حلان

$$S = \left\{ -\frac{5}{3}, 3 \right\}$$

مثال 2 :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $|-x+2|=3x-1$... (1)

▪ نحدد إشارة $(-x+2)$ ثم نكتب $|-x+2|$

دون رمز القيمة المطلقة

$$x \in \mathbb{R} : -x+2 \geq 0 \text{ معناه } x \leq 2$$

وبالتالي :

$$|-x+2| = \begin{cases} x-2 & ; x \geq 2 \\ -x+2 & ; x \leq 2 \end{cases}$$

لحل المعادلة (1) نميز إذا الحالتين الآتيتين :

$$x \geq 2$$

$$(1) \text{ تكافئ } x-2=3x-1$$

$$\text{تكافئ } -2x=1$$

(1) تكافئ $x = -\frac{1}{2}$ (مرفوض : $2; +\infty[$) $-\frac{1}{2} \notin [2; +\infty[$

$x \leq 2$

(1) تكافئ $-x+2=3x-1$

تكافئ $-4x=-3$

تكافئ $x = \frac{3}{4}$ (مقبول : $]-\infty; 2]$) $\frac{3}{4} \in]-\infty; 2]$

وبالتالي : $S = \left\{ \frac{3}{4} \right\}$

مثال 3 :

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $|x+1|+|x-3| \geq 7$... (1)

يمكن التأكد من صحة النتائج الواردة في الجدول الموالي :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$ x+1 $	$-x-1$	$x+1$	0	$x+1$
$ x-3 $	$-x+3$	0	$-x+3$	$x-3$
$ x+1 + x-3 $	$-2x-2$	4	4	$2x-2$

لحل المتراجحة السابقة ؛ كما هو الحال بالنسبة للمعادلات ، نميز الحالات الآتية :

• $x \in]-\infty; -1]$

(1) تكافئ $-2x-2 \geq 7$

تكافئ $-2x \geq 9$ أي $x \leq -\frac{9}{2}$

نلاحظ ما يلي : $]-\infty; -1] \subset]-\infty; -\frac{9}{2}]$

وبالتالي هذا الحل مقبول .

• $x \in [-1; 3]$

حسب الجدول :

من أجل كل x من المجال $[-1; 3]$:

$|x+1|+|x-3|=4$

وعليه : لا توجد حلول في هذا المجال .

• $x \in [3; +\infty[$

المتراجحة مكافئة لـ : $2x-2 \geq 7$

أي $x \geq \frac{9}{2}$


: الحل مقبول : $\left[\frac{9}{2}; +\infty[\subset [3; +\infty[$

👉 مما سبق نستنتج أنه إذا كانت S هي

مجموعة الحلول فإنّ : $S = \left] -\infty; -\frac{9}{2} \right] \cup \left[\frac{9}{2}; +\infty \right[$



تمرين 1 :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $2|3x+1|=5|x-1|$




تمرين 6 :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $\sqrt{(2x-1)^2} = 2\left|\frac{1}{2}x-3\right|$



تمرين 4 :

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة : $|3x-2| \geq 2x-1$



تمرين 5 :

عين مجموعة الأعداد الحقيقية x التي من أجلها يكون : $5 \leq |x+1| \leq 7$

