

درس : كثير الحدود

1/ الدالة كثير الحدود :

تعريف : نسمي الدالة كثير حدود كل دالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بمايلي :

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

حيث n عدد طبيعي و $a_0, a_1, \dots, a_n$ أعداد حقيقية ثابتة.

2/ درجة كثير الحدود :

• كل دالة كثير حدود غير معدومة f تكتب بطريقة واحدة حيث :

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \text{ مع } a_n \neq 0$$

يسمى العدد الطبيعي n درجة كثير الحدود f ، تسمى الأعداد $a_0, a_1, \dots, a_n$ معاملاته

3/ تساوي كثير الحدود :

- يكون كثيرا حدود ، غير معدومين، متساويين إذا و فقط إذا كانا من نفس الدرجة و كانت معاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية.
- يكون كثير حدود معدوما إذا و فقط إذا كانت كل معاملاته معدومة.

4/ العمليات على كثير حدود :

i. الحساب الجبري لكثير حدود :

1. مجموع، فرق و جداء كثيرات حدود هي كثيرات حدود.
2. مركب كثيري حدود هو كثير حدود.
3. جداء كثيري حدود غير معدومين درجتاهما n و p على الترتيب هو كثير حدود درجته $(n+p)$.

ii. جذر كثير حدود :

f كثير حدود درجته اكبر من او تساوي 1 و α عدد حقيقي حيث

$$f(\alpha) = 0 \text{ يعني } \alpha \text{ جذر لكثير الحدود } f$$

4/ تحليل كثير حدود باستعمال $(x - \alpha)$:

f كثير حدود درجته اكبر من او تساوي 1 و α عدد حقيقي حيث

إذا كان $f(\alpha) = 0$ فانه يوجد كثير حدود g من اجل كل عدد حقيقي x فان

$$f(x) = (x - \alpha)g(x)$$



MD-ROUCHANE

تطبيقات كثير الحدود

تطبيق 1:

هل الدوال التالية كثيرات حدود ؟ إذا كانت الإجابة بنعم حدد درجتها

$$f(x) = (\cos x)^2 + 2 \cos x + 1 ; f(x) = \frac{x^2+4x+4}{x+2} ; f(x) = (x+1)(x^2-2)$$

تطبيق 2:

$$f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4 \text{ دالة كثير حدود معرفة بـ:}$$

1. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x :

$$f(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$$

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول x : $f(x) = 0$

تطبيق 3:

نعتبر الدالتين كثيري الحدود f و g المعرفتين كمايلي : $f(x) = 2x^2 - 2x$ و $g(x) = -x^2 + 3x - 7$

1. عين كثيرات الحدود التالية: $f+g$ ، $2f-3g$

2. عين كثير الحدود $f \times g$ محدد درجته.

MD-ROUCHANE

تطبيق 4:

$$f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4 \text{ دالة كثير حدود معرفة بـ:}$$

تحقق أن العدد 2 جذر لكثير الحدود f

عين كثير حدود g بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = (x-2)g(x)$

تطبيق 5:

نعتبر ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية f المعرف بـ: $f(x) = x^2 + 3x - 4$

1. عين الشكل النموذجي لـ $f(x)$

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$x^2 + 2x = 0 \text{ (أ) } x^2 + x + 1 = 0 \text{ (ب) } x^2 - 4x + 4 = 0 \text{ (ج) } x^2 + x - 6 = 0 \text{ (د)}$$

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

$$2x^2 + 4x - 6 \leq 0 \text{ (أ) } -x^2 + 10x - 25 \geq 0 \text{ (ب) } x^2 - x + 4 < 0 \text{ (ج)}$$

