

امتحان البكالوريا التجريبية دورة ماي 2016


على المترشح اختيار موضوع واحد :

الموضوع الأول


التمرين الأول: (10 نقاط):

يعود سبب الإصابة بالزكام إلى فيروس الزكام الذي توجد منه سلالات مختلفة، قصد فهم بعض آليات الاستجابة المناعية الموجهة ضده وتفسير سبب تكرار الإصابة به، نقترح دراسة المعطيات التالية:

1. تمثل الوثيقة -1- رسما تخطيطيا مبسطا للبنية العامة لفيروس الزكام، والوثيقة -2- تمثل تطور تركيز كل من فيروس الزكام واللمفاويات القاتلة LTC ومضادات الأجسام في دم شخص تعرض للعدوى بهذا الفيروس.



الوثيقة 2



الوثيقة 1

- أ- استخرج من الوثيقة -2- نوع المناعة الموجهة ضد فيروس الزكام. علل إجابتك.
- يلخص الجدول التالي نتائج حقن فيروس الزكام لفئران غير محصنة ضد هذا الفيروس وفق الحالتين التاليتين:

الحالة	النتائج
الحالة (أ): فئران بدون غدة سغرية	تكاثر فيروس الزكام.
الحالة (ب): فئران ولدت دون غدة سغرية تم حقنها بمصل أخذ من فئران محصنة ضد نفس فيروس الزكام.	توقف تكاثر فيروس الزكام لكنه لا يختفي من الجسم.

ب- فسر النتائج المحصل عليها في الحالتين.

- تم أخذ لمفاويات من دم شخص محصن منذ أسابيع ضد فيروس الزكام وأنجزت عليه التجربتان التاليتان:

الظروف التجريبية	النتائج
التجربة (أ): وضع اللمفاويات المذكورة مع خلايا مصابة بنفس فيروس الزكام تنتمي لنفس الشخص.	تدمير الخلايا المصابة من طرف اللمفاويات
التجربة (ب): وضع اللمفاويات المذكورة مع خلايا مصابة بنفس فيروس الزكام تنتمي لشخص آخر.	عدم تدمير الخلايا المصابة


ج- كيف تفسر الاختلاف الملاحظ في النتائج المحصل عليها في التجربتين (أ) و (ب)؟

د- معتمدا على نتائج الجدولين ومكتسباتك، فسر النتائج الممثلة في الوثيقة -2-.

هـ- أنجز مخطط تلخص مراحل الإستجابة المناعية المتدخلة ضد فيروس الزكام.

2. قصد التعرف على سبب تكرار الإصابة بالفيروس نقترح عليك الدراسة التالية:


تعرض الشخص (س) للفيروس خلال 3 مرات، الأولى عندما كان عمره سنتان والثاني عندما أصبح 5 سنوات والأخيرة عندما صار عمره 20 عاما. شكل الفيروس وكمية الأجسام المضادة المتشكلة بعد كل إصابة ملخصة في الرسومات التخطيطية والأعمدة البيانية المبينة في الوثيقة -3-:



التمرين الثاني: 10ن:

تتمثل المورثة في تتالٍ معيّن من النكليوتيدات الداخلة في تركيب الـ ADN والتي تشفر لتتالي الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين.

يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) إحدى مراحل تشكل إنزيم Phényl-Alanine Hydroxylase (PAH) على مستوى عضوية خلوية.



- 1- ما هي العضوية الخلوية المعنية؟
 - 2- تعرّف على المرحلة الممثلة في الشكل (1)، ثم حدّد أهم العناصر المتدخلة في ذلك.
 - 3- لفهم آلية تركيب هذا الإنزيم نقترح عليك الشكل (2) من الوثيقة (1).
- أ- سمّ ببيانات العناصر المرقمة.


ب- العنصر (4) من الشكل (2) يُظهر ارتباط العنصرين (A) و (C)، اشرح كيف يتم هذا الارتباط، موضّحاً ذلك باستعمال الصيغة العامة لـ (A) و (C).

ج- مثل قطعة الـ ADN الموافقة لتتالي وحدات العنصر (5) من (D) إلى (A).

4- لدراسة بعض خصائص وحدات العنصر (5)، وضعت قطرة من محلول به ثلاث وحدات (A, C, E) في منتصف شريط ورق الترشيح مبلل بمحلول منظم ذو $PH = 6$ في جهاز الهجرة الكهربائية. النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$ Acide Glutamique	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{Lysine} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ الشكل (ب)	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{COOH} \\ \\ \text{H} \end{array}$ Glycine	ورقة مبللة (PH = 6) + A C E موضع القطرة الشكل (أ) الوثيقة (2)
---	--	---	---

- أ- قارن Phi الوحدات الثلاث بـ PH الوسط مع التعليل.
- ب- إذا علمت أن الشكل (ب) من الوثيقة (2) يمثل الصيغ الكيميائية للوحدات (A, C, E).
- ب₁- أربط الوحدات (A, C, E) بما يقابلها من عناصر الشكل (ب) مع التعليل.
- ب₂- اكتب الصيغة الكيميائية لكل وحدة من هذه الوحدات عند $PH = 6$.
- ج- استخلص خاصية هذه الوحدات.
- 5- تأخذ جزيئة الإنزيم المتشكلة بنية فراغية محددة تسمح له بأداء وظيفته.
- الأشكال (1)، (2)، (3) من الوثيقة (3) تمثل نتائج دراسة إنزيم (PAH) باستخدام برنامج Rastop.
- أ- وضح العلاقة بين أشكال هذه الوثيقة.



- ب- استنتج المستوى البنائي لإنزيم (PAH).
- ج- ما هي أهمية دراسة التمثيل الفراغي المبين في الشكل (3)؟
- د- ما نوع الروابط التي تسمح بالمحافظة على استقرار بنية الشكل (3).

الموضوع الثاني



التمرين الأول: (10 نقاط)

يعتمد تخصص الإنزيمات على بنيتها الفراغية لذا نقترح دراسة العوامل المتحكمة في البنية الفراغية للبروتين.
I- إن انزيم البريمياز يتواجد على مستوى غشاء الكريات الحمراء ويساهم في نقل الغلوكوز إلى داخل الكرية الحمراء، الشكل (ب) من الوثيقة 1- يوضح جزءا من هذا الإنزيم، الشكل (أ) من الوثيقة 1- يمثل إحدى المراحل التي تسمح بتركيب إنزيم البريمياز.

1- تعرف على البنيات المشار إليها في الوثيقة 1-.

2- مثل بنية الجزء المؤطر من الوثيقة 1-.

3- صف آلية المرحلة الممثلة في الشكل (أ) بدقة مع ذكر دور مختلف العناصر المتدخلة في هذا النشاط.



الوثيقة 1

II- غالبا ما تكون الظاهرة الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1- متبوعة بظاهرة أخرى. لدراسة بعض مراحل هذه الظاهرة وشروط حدوثها ننجز التجارب التالية:

التجربة 1:

نحضر مستخلصا خلويا من الخلايا β لجزر لنجرهانس تحتوي على أحماض أمينية يكون الحمض الأميني التيروسين مشعا وتوزع على أربع أوساط حسب الجدول التالي:



الوسط	المواد المضافة إلى المستخلص	الإشعاع في البروتين (وحدة افتراضية)
1	ريبوزومات + ATP + ARNm	406
2	ATP + ARNm	15
3	ريبوزومات + ARNm	50
4	ريبوزومات + ATP	5

1- حلل نتائج الجدول.

2- حدد شروط تركيب البروتين.

3- ماهو دور كل عنصر من العناصر المذكورة في الجدول باختصار؟

التجربة 2:



تم إجراء التجربة على خليتين (خ1) و (خ2): في بداية التجربة توضع الخليتين (خ1) و (خ2) على التوالي في وسط زرع (م1) و (م2) يحتويان على نفس المكونات طيلة هذه التجربة، نمد الوسطين (م1) و (م2) بنفس الأحماض الأمينية كما وكيفا في الزمن (ز1) أضيف للوسط (م2) البيروميسين (مادة تثبط نشاط الـ ARNt). وقد مكنت معايرة كميات الأحماض الأمينية التي بقيت حرة في سيتوبلازم كل من الخليتين (خ1) و (خ2) من الحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة 2-.

1- قارن النتائج المحصل عليها عند الخليتين (خ1) و (خ2) من حيث كمية الأحماض الأمينية الحرة في السيتوبلازم.

2- كيف تفسر نتائج هذه المقارنة؟

III- تمثل الوثيقة (3) رسما تفسيريا تخطيطيا للظاهرة المدروسة في الجزء II لصورة مجهرية لنشاط إحدى مورثات بكتيريا القولون المعوية.

1- تعرف على البيانات المرقمة، ثم تعرف على هذه الظاهرة.


2- أنجز رسما تخطيطيا عليه البيانات للجزء المؤطر من الوثيقة 3-.

3- ماهي المعلومات التي يمكنك استخراجها فيما يتعلق بالعلاقة بين الظاهرتين المدروستين؟ علل.

التمرين الثاني: 10ن:

تنتج الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) عن مهاجمة فيروس الـVIH لبعض الخلايا المناعية و تدميرها مما ينجم عنه قصور في الجهاز المناعي .

I/- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) تطور تركيز كل من اللمفاويات T_4 و T_8 و الأجسام المضادة والشحنة الفيروسية للVIH في الدم .



انطلاقاً من الشكل (أ) من الوثيقة 1 و معارفك المكتسبة :

1/- لماذا يعتبر فيروس الـ HIV من الفيروسات الراجعة ؟

2- استخراج أنواع الاستجابة المناعية المتدخلة إثر الإصابة بفيروس الـ VIH .

3- حدد تأثير الإصابة بفيروس الـVIH على تطور كل من T_4 و T_8 وعلى الأجسام المضادة .

II-1/- في الحالة العادية يهاجم فيروس الـ VIH اللمفاويات T_4 وفق المراحل المبينة في الشكل (ب) من الوثيقة 1


- وضح آلية مهاجمة فيروس ال VIH للمفاويات T₄.

2- من بين العلاجات الجديدة المقترحة في مجال مكافحة الإيدز استعمال جزيء (IDC16) لدراسة تأثير هذا العلاج على

الإصابة بفيروس الـVIH ، قمنا بزرع خلايا مصابة بفيروس الـVIH لمدة 14 يوما في وجود و في غياب

جزء (IDC16) ، ثم تتبعنا التطور الكمي لأحد بروتينات الفيروس (P24) و ARN الأولي (mpARN) و الـ ARNm

النوعي للفيروس في هذه الخلايا . الوثيقة 2 توضح مراحل و نتائج التجربة .



أ/- حل وفسر نتائج التجربة .

ب/- ماذا تستخلص حول طريقة تأثير جزيء (IDC16) ؟

III-/- اعتمادا على معطيات التمرين ومعلوماتك المكتسبة فسر العلاقة بين فيروس الـVIH و LT_4 والأمراض الانتهازية و العجز المناعي .

التمرين الأول 10ن:

- 0.75 1/-/أ- استجابة مناعية خلطية :إنتاج أجسام مضادة ضد البروتين H الفيروسي
- 0.75 - استجابة مناعية خلوية : ظهور اللمفاويات Tc موجهة ضد الخلايا المصابة بالفيروس .
- 0.75 ب/- في الحالة (أ) : غياب الغدة السعترية يؤدي الى عدم نضج اللمفاويات T و عدم اكتسابها كفاءة مناعية و بالتالي غياب تنشيط اللمفاويات B من طرف T4 و بالتالي عدم إنتاج أجسام مضادة و بالتالي تكاثر الفيروس .
- 0.5 - في الحالة (ب): احتواء المصل على أجسام مضادة ضد مولد الضد الفيروسي و بالتالي ابطال مفعول مولدات الضد الفيروسي مما يؤدي الى توقف تكاثر الفيروس ,
- 0.25 - عدم اختفاء الفيروس راجع لعدم وجود اللمفاويات Tc.
- 0.5 ج/- عند نفس الشخص تتعرف اللمفاويات T على المحددات المستضدية المعروضة بواسطة CMH الخلايا المصابة (تعرف مزدوج) و تؤدي الى تدميرها .
- 0.5 - عند شخص ذي CMH مختلف لا تتعرف اللمفاويات T على المحددات المستضدية المعروضة بواسطة CMH الخلايا المصابة و بالتالي لا يتم تدميرها .
- 1 د/- بعد الإصابة يرتفع تركيز فيروس الزكام نتيجة تكاثره داخل الخلايا المستهدفة، بعد يومين من الإصابة تتدخل الاستجابة المناعية الخلوية عن طريق Tc التي تعمل على تدمير الخلايا المصابة مما يؤدي الى انخفاض تركيز الفيروس في الدم .
- ابتداء من اليوم الرابع يتم تدعيم الاستجابة الخلوية بالاستجابة الخلطية عن طريق الأجسام المضادة النوعية (antiH) لتوقيف تكاثر الفيروس .بعد عشرة أيام يتم التخلص نهائيا من الفيروس .
- 0.5 2/- أ/- عند تعرضه للإصابة الأولى تشكلت أجسام مضادة ضد المستضدات BCD A و تمثل استجابة أولية كمية الأجسام المضادة قليلة .
- 3 - عند تعرضه للإصابة الثانية تشكلت أجسام مضادة ضد المستضدات A و C و لكن بكمية أكبر من الإصابة السابقة (استجابة ثانوية) و لم تتشكل اجسام مضادة ضد D و B لأن الفيروس لا يحتويها .
- عند تعرضه للإصابة الثالثة تشكلت أجسام مضادة ضد المستضدات A ولكن بكميات أكبر و تشكلت أجسام مضادة ضد D بكمية كبيرة لأنها استجابة ثانوية و لم تتشكل أجسام مضادة ضد C و B لأن الفيروس أصبح لا يحتويها .
- 0.5 الاستنتاج : سبب الإصابة المتكررة بالفيروس تعود الى الطفرات المتتالية التي يعانيتها و التي تسمح له بالتغير و التجدد باستمرار .
- 1.5 ب/- الرسم التخطيطي : يرسم ارتصاص فيروس الزكام بنوعين من الأضداد ضدA و ضدD .
- التمرين الثاني 10ن:**
- 0.25 1/- العضية الخلوية المعنية هي الشبكة الهيولية المحببة (الفعالة)
- 0.25 2/- المرحلة الممثلة في الشكل 1 هي مرحلة الترجمة
- 1 أهم العناصر المتدخلة فيها هي :الريبوزومات ، الmARN ،أحماض امينية منشطة ،طاقة في شكل ATP .
- 1.5 3/- أ/- تسمية العناصر المرقمة :
- 1-وحدة ريبوزومية ، 2-tARN ، 3-حمض أميني ، 4-رابطة بيتيدية ، 5-سلسلة بيتيدية ، 6-mARN .
- ب/- شرح كيفية ارتباط الحمضين الأمينيين A و C:

ج/- تمثيل الADN الموافقة للسلسلة البيبتيدية :

II- التجربة 1:


1/- تحليل نتائج الجدول :

- *الوسط 1: استعمال كبير جدا للحمض الأميني المشع فيتتركب البروتين لوجود كل متطلبات تركيب البروتين .
 *الوسط 2: استعمال ضعيف جدا للحمض الأميني في هذا الوسط لغياب الريبوزومات .
 *الوسط 3: استعمال ضعيف جدا للحمض الأميني في هذا الوسط لغياب ال ATP .
 *الوسط 4: استعمال ضعيف جدا للحمض الأميني في هذا الوسط لغياب ال mARN .
 2/- شروط تركيب البروتين هي : توفر الريبوزومات + ال ATP + ال mARN .
 3/- دور هذه العناصر : -ال mARN: يحمل المعلومة (الشفرة) للبروتين المعني ,
 - ال ATP : توفير الطاقة اللازمة لتنشيط الأحماض الأمينية و تشكيل الروابط الببتيدية بينها .
 -الريبوزومات : قراءة ال mARN وربط الأحماض الأمينية (مقر الترجمة) .

التجربة 2:

- 1/- مقارنة النتائج: نلاحظ أن كمية الأحماض الأمينية الحرة في سيتوبلازم الخلية خ 1 أقل من كمية الأحماض الأمينية الحرة في سيتوبلازم الخلية خ 2 المعالجة بمادة البيروميسين .
 2/- التفسير يفسر انخفاض كمية الأحماض الأمينية الحرة في سيتوبلازم الخلية خ 1 بدمجها في البروتينات في حين تبقى كمية الأحماض الأمينية الحرة في سيتوبلازم الخلية خ 2 مرتفعة نظرا لعدم دمجها و بالتالي عدم تركيب البروتين بسبب تعطل نشاط tARN الذي ينقل الأحماض الأمينية الى الريبوزومات .
 III-1/- التعرف على البيانات المرقمة :

- 1- ADN 2- انزيم ARN بوليميراز 3- mARN 4- بوليزوم 5- سلسلة متعدد ببتيد .
 2/- الرسم التخطيطي للجزء المؤطر :



- 3/- حسب الوثيقة المعلومة المستخرجة هي : مرحلتي التعبير الوراثي (الاستنساخ و الترجمة) تحدثان في آن واحد عند البكتريا حيث تبدأ الترجمة قبل انتهاء الاستنساخ .
 التعليل: لأن البكتريا من بدائيات النواة ال ADN موجود في الهيولى (عدم وجود غلاف نووي) .

التمرين الثاني:

- I-1/- يعتبر فيروس ال VIH من الفيروسات الراجعة لأن مادته الوراثية عبارة عن ARN تحتاج الى النسخ العكسي .
 2/- نوع الاستجابة المناعية المتدخلة اثر الإصابة بفيروس VIH :
 -استجابة مناعية ذات وساطة خلوية . التعليل :تدخل الخلايا LT₈ .
 -استجابة مناعية ذات وساطة خلوية . التعليل :تدخل الأجسام المضادة ضد VIH .
 3/- تحديد تأثير الإصابة ب VIH على تطور كل من LT₈ و LT₄ و الأجسام المضادة :
 - انخفاض شديد في تركيز اللمفاويات LT₄ حتى تكاد تنعدم .
 -انخفاض تدريجي في تركيز اللمفاويات LT₈ .
 - ارتفاع في تركيز الأجسام المضادة ثم انخفاضها حتى تكاد تنعدم .

II-1/- آلية مهاجمة الفيروس لل LT_4 في الحالة العادية :

- 1.5 - ينتبث فيروس VIH على الخلايا LT_4 نتيجة التكامل البنيوي بين البروتينات الغشائية (gp 120) و (gp41) للفيروس مع المستقبلات الغشائية (CD4) و (CCR5) للخلايا LT_4 .
- يلتحم غشاء الفيروس مع غشاء اللمفاوية LT_4 و تحقق المادة الوراثية للفيروس في سيتوبلازم LT_4 .

2/- أ/- تحليل و تفسير نتائج التجربة :

- 1.5 - نلاحظ ارتفاع معتبر في تركيز البروتين (p24) الفيروسي حتى يصل ل قيمة قصوى في اليوم السابع ثم تبقى ثابتة تقريبا و ذلك في الخلايا المصابة غير المعالجة بجزيء (IDC16) ، أما في الخلايا المصابة و المعالجة فنلاحظ فيها ارتفاع طفيف في تركيز البروتين (p24) الفيروسي و نفس ذلك بأن جزيء (IDC16) يثبط تركيب البروتين (p24).
0.75 -تركيز (ARNpm) لا يتغير في وجود أو غياب جزيء (IDC16) و نفس ذلك بأن جزيء (IDC16) ليس له تأثير على عملية الاستنساخ.
1.5 - تركيز ARNm الفيروسي يكون كبير في الخلايا المصابة في غياب جزيء (IDC16) و يكون صئيل جدا في الخلايا المصابة في وجود جزيء (IDC16) و يفسر ذلك بأن جزيء (IDC16) يثبط تركيب ARNm الفيروسي.
0.5 ب/- استخلاص طريقة تأثير جزيء (IDC16):
يمنع تركيب ARNm انطلاقا من ARNpm (يثبط نضج ARNm).

- 2 III/- تفسير العلاقة بين فيروس VIH و LT_4 والأمراض الانتهازية و العجز المناعي :
فيروس VIH عند دخوله الى العضوية يهاجم الخلايا LT_4 مما يؤدي الى انخفاض تركيزها .
تلعب الخلايا LT_4 دورا محوريا في الاستجابة المناعية بنوعها فغياب LT_4 يؤدي الى غياب الأنترلوكينات ما ينتج عنه :- عدم تنشيط الخلايا LT_8 فلا تتكاثرولا تتمايز الى TcL (غياب الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية).
- عدم تنشيط الخلايا LB فلا تتكاثر و لا تتمايز الى LBp منتجة للأجسام المضادة (غياب الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية) .
عندها يصبح الجهاز المناعي عاجزا عن التصدي لمخلف المستضدات الانتهازية و تصبح العضوية معقلا للأمراض الانتهازية .