

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مؤسسة التربية والتعليم الخاصة - سليم -

S . A . L . I . M ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT - SALIM -

رخصة فتح رقم: 22/2009 المؤرخة في 27 أوت 2009
المعدة لرخصة فتح رقم: 06/2005 المؤرخة في 5 سبتمبر 2005

تحضيري - ابتدائي - متوسط - ثانوي

إعتماد رقم 39 المؤرخ في 20 جوان 2009
المعدل لإعتماد رقم 66 المؤرخ في 8 جوان 2005

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية

المدة : 3 ساعات

السنة الدراسية : 2011 / 2012

اختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الطبيعية :

التمرين الأول:

تدل جميع المشاهدات بواسطة المجهر الضوئي على وجود وحدة بنوية واحدة لجميع الخلايا ، لذلك تعتبر الخلية الوحدة البنائية للكائن الحي .

1- تمثل الوثيقة 1 خليتين (أ) ، (ب) :

أ- أعط عنوانا مناسباً لكل شكل .

ب- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 12.

2- القواعد الآزوتية التي تدخل في بناء أحد


مكونات العنصر (ك) لها خاصية امتصاص

الأشعة فوق البنفسجية UV ذات طول الموجة

260 نانومتر .

❖ بهدف معرفة التركيب الكيميائي للعنصر (ك) نعرضه للأشعة UV بين موجتي 200-300 نانومتر و

النتائج مدونة في الوثيقة 2 بحيث $K = K_1 + K_2$.



* المنحنى 1 يمثل امتصاص الجزء ك₁

الذي يحتوي على قواعد آزوتية.

* المنحنى 2 يمثل امتصاص الجزء ك₂

الذي لا يحتوي على القواعد الآزوتية.

أ- اعتماداً على الوثيقة و على معلوماتك

استخلص التركيب الكيميائي للعنصر (ك).

❖ عند إعادة نفس التجربة على العنصر

(ك') المستخلص من الخلية (ب) لا

يظهر إلا المنحنى رقم 1.

ب- ماذا تستخلص من ذلك؟

❖ التحليل الكيميائي في وجود الـ ADNase للعنصر (ك)

أعطى مادة صيغتها الكيميائية ممثلة في الوثيقة 3.

أ- ماذا تسمى هذه العملية.

ب- ماذا تمثل هذه المادة؟

❖ نجري إمالة لهذه المادة في الموقع 2، ثم في الموقعين

1 و 2 معا. حدد نواتج الإمالة في كل حالة.

د- بسمح التقدير الكمي للمادة المفصولة من تحديد

نسبة الوحدة G و التي تساوي: 20%.


أ- حدد نسبة الوحدات المشابهة لها ؟

ب- إذا علمت أن العدد الكلي المكون للجزيئة المدروسة تساوي 30، حدد عدد كل وحدة. ثم ارسم إحدى

الاحتمالات النظرية لهذه الجزيئة.

التمرين الثاني:

أ- يمثل وجود البروتينات النووية أبسط مظهر من مظاهر الحياة ، من أحد مكوناتها الحمض النووي ADN.



تمثل الوثيقة رسماً تخطيطياً لجزيئة الـ ADN.

1- صف بنية هذه الجزيئة.

2- ماذا تلاحظ بخصوص عدد الروابط بين سلسلتي الـ ADN؟

3- متى يكون جزيء الـ ADN أكثر تماسكاً حسب اعتقادك؟

4- يبين الجدول التالي نسبة القواعد الآزوتية في جزيئات

ADN عند كائنات مختلفة.

النوع / القواعد	A	G	C	T
الدجاج	28,8	20,5	21,5	29,3
قنفذ البحر	32,8	17,7	17,3	32,1
بكتيريا E. coli	24,7	26	25,7	23,7

- حلل النتائج المحصل عليها بعد حساب النسب التالية :

$$\frac{C+G}{A+T} \text{ و } \frac{C}{G} \text{ ، } \frac{A}{T}$$

- ماذا تستنتج؟


II- تم حساب نسبة $\frac{C}{G}$ و $\frac{A}{T}$ عند اليوجلينا و عند كائن مجهول ، يبين الجدول التالي النتائج المحصل عليها:

نوع الـ ADN	اليوجلينا	مجهول
1	1	1.34
0.65		

1- حلل النتائج ثم فسرهما؟

2- ماذا تستنتج؟

III- سمح جهاز خاص (جهاز المطياف) و بتقنية خاصة من تتبع انفصال سلسلي ال ADN و ذلك بتغيير درجة الحرارة للنتائج المحصل عليها عند دراسة انفصال سلسلي ال ADN للكائنات المدروسة في الجدول السابق (السؤال 4 الجزء I)، علما أن جزيئة ال ADN لهذه الكائنات تحتوي على نفس عدد النيكليوتيدات و لها نفس الطول، ممثلة في منحنيات الوثيقة التالية:



1- أنسب كل منحنى للكائنات المدروسة في السؤال 4 الجزء I.

2- حلل هذه النتائج.

3- هل هذه النتائج المحصل عليها تتوافق مع

اقتراحك في السؤال السابق؟

التمرين الثالث:

لمعرفة طبيعة المادة الوراثية التي تنتقل عبر الأجيال المتتالية قام غريفيث بمجموعة من الدراسات:

أولاً: قام بمجموعة من التجارب حيث لاحظ وجود نمطين من المكورات الرئوية:

النمط (S) : سلالة طبيعية ممرضة لها محافظ تشكل مستعمرات ملساء.

النمط (R) : سلالة غير ممرضة ليس لها محافظ تشكل مستعمرات خشنة.

التجارب و نتائجها موضحة في الجدول:

رقم التجربة	المكورات المحقونة في الفأر	حالة الفأر بعد الحقن	طبيعة المكورات في دم الفأر
1	(S) حية	موت الفأر	(S) حية
2	(R) حية	عدم موت الفأر	عدم وجود مكورات
3	(S) مقتولة بالحرارة	عدم موت الفأر	عدم وجود مكورات
4	(S) مقتولة بالحرارة (R)+ حية	موت الفأر	(S) حية

1- فسر النتائج المحصل عليها في 1 ، 2 ، و 3 .

2- ماذا تستنتج من نتائج التجربة 4.

ثانياً: لتحديد العامل المسؤول عن نتائج التجربة 4 قام بمجموعة من التجارب التالية:

رقم التجربة	المكورات المحقونة في الفأر	النتائج:
أ	(R) حية + بروتين من النمط (S)	عدم موت الفأر
ب	(R) حية + ARN من النمط (S)	عدم موت الفأر
ج	(R) حية + ADN من النمط (S)	موت الفأر

ملاحظة: ARN = حمض نووي ريبوي.

3- ماذا تستنتج؟

4- كيف تفسر نتائج التجربة 4 من الدراسة الأولى (السؤال السابق).

ثالثاً: قام بمجموعة من التجارب على سلالتين من البكتيريا ، يختلف سلوكهما تجاه المضاد الحيوي ستربتوميسين.

السلالة 1: حساسة للمضاد الحيوي (تموت في وجوده)، نرسم لها ب(ح).

السلالة 2: مقاومة لنفس المضاد الحيوي ، نرسم لها ب(م).

أجربنا على هاتين السلالتين التجارب الموضحة في الجدول التالي:


رقم التجربة	معالجة المزرعة البكتيرية	عدد البكتيريا في 1 ملل من الوسط
1	(ح) + ستربتوميسين	0
2	(م) + ستربتوميسين	107
3	(ح) + رشاحة (م) لمدة (24 ساعة) ثم + ستربتوميسين	107
4	(ح) + رشاحة (م) معالجة بإنزيم محلل للبروتين (24 ساعة) + ستربتوميسين	107
5	(ح) + رشاحة (م) معالجة بإنزيم محلل للـ ADN (24 ساعة) + ستربتوميسين	0

ملاحظة: الرشاحة (م) هي سائل خال من خلايا البكتيريا (م) ولكنه يحتوي على مكوناتها.

أ- فسر النتائج المحصل عليها في هذه التجارب.

ب- ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها؟

ج- هل تستطيع القيام بتجارب أخرى تؤكد نتائج هذه التجربة؟ إذا كانت الإجابة نعم فما هي هذه التجارب؟



المستوى: 2ASS	تصحيح إختبار الفصل 2 في مادة العلوم الطبيعية	العام الدراسي: 2011-2012
---------------	---	--------------------------

التمرين الأول:

1 - أ- العنوان المناسب:

الشكل أ: رسم تخطيطي لخلية حيوانية. (حقيقية النواة) كما تبدو تحت المجهر الإلكتروني.

الشكل ب: رسم تخطيطي لخلية بدائية النواة. (بكتيريا) كما تبدو تحت المجهر الإلكتروني.

ب- البيانات:

1 - جسيم مركزي

2- غلاف نووي

3- جهاز غولجي

4- حويصلات إفريزية

5- شبكة هيولية فعالة

6- نوية

7- ريبوزومات

8- شبكة هيولية ملساء

9- مميتوكوندري

10- هيولى

11- غشاء هيولى

12- محفظة

2- أ- التركيب الكيميائي للعنصر ك هو ADN + بروتين (الهيستون).

ب- نستخلص أن الصبغي عند بدائيات النواة يتكون من ADN فقط.

أ- تسمى هذه العملية بالإمالة الجزئية.

ب- تمثل هذه المادة : النكليوتيدة (dGMP)

ج- نواتج الإمالة : الموقع (2) نيكليوزيدة + حمض الفوسفور.

* نواتج الإمالة في الموقع (1) و (2) :

قاعدة G (غوانين) ، حمض الفوسفور ، سكر خماسي منقوص الأكسجين.

د - أ) $G = 20\%$

حسب نتائج شارغاف:

$A=T$, $G=C$

حي قعلول - برج البحري - الجزائر

و منه $G=C=20\%$

بينما $A+T+G+C=100\%$

$$A+T+20\%+20\%=100\%$$

$$A+T+40\%=100\%$$

$$A+T=100\%-40\%$$

$$A+T=60\%$$

$$A=T=\frac{60}{2}$$

$$A=T=30\%$$

و منه $A=30\%$, $T=30\%$, $G=20\%$, $C=20\%$

(ب) - $A+T+G+C=30$

و منه $100\% \rightarrow 30$

$$G=C=6 , G=6$$

$$A=T=9$$

* رسم تخطيطي لجزيئة الـ ADN.

التمرين الثاني:

1 - 1- وصف بنية جزيئة الـ ADN:

يتكون الـ ADN من سلسلتين متعددي النيكليوتيدات ملتفتان حول بعضهما ترتبط سلسلتا الـ ADN بواسطة الروابط الهيدروجينية التي تربط القواعد الآزوتية المتقابلة للسلسلتين حيث تقابل قاعدة التايمين قاعدة الأدينين و جزيئة الغوانين تقابل جزيئة السيتوزين.

2- نلاحظ بخصوص عدد الروابط بين سلسلتي الـ ADN:

تواجد رابطتين هيدروجينيتين بين A و T ، و تواجد ثلاث روابط هيدروجينية بين G و C.

3- يكون جزيء الـ ADN أكثر تماسكا عندما تكون نسبة G و C مرتفعة في الجزيئة. (عندما يكون عدد الروابط الهيدروجينية مرتفعا)

4- عند حساب $\frac{A}{T}$ و $\frac{C}{G}$ عند جميع الكائنات نجد أنها مساوية تقريبا لـ 1 ، أما عند حساب $\frac{C+G}{A+T}$ نجد النسبة تختلف عن الواحد.

و منه نستنتج أنه في جزيئة الـ ADN عدد القواعد الآزوتية الأدينين مساوية لعدد القواعد الآزوتية التايمين $T=A$ و $C=G$.

بينما لا تتساوى عدد القواعد الآزوتية (A و T) مع (C و G) و منه جزيئة الـ ADN عند هذه الكائنات يتكون من سلسلتين يتقابل فيها A مع T و G مع C.

الدجاج	0.98	1.04	0.72
قنفذ البحر	1.02	0.97	0.53
بكتيريا E.coli	1.04	0.98	1.06

2-1- عند حساب $\frac{C}{G}$ و $\frac{A}{T}$ عند اليوجلينا نجد أن $\frac{C}{G}$ و $\frac{A}{T}$ تساوي 1 بينما عند الكائن المجهول لا تساوي النسبة 1 و

ذلك لأنه عند اليوجلينا $T=A$ و $G=C$ بينما عند الكائن المجهول $T \neq A$ و $C \neq G$.

2-2- نستنتج أن جزيئة ADN عند اليوجلينا تتكون من سلسلتين بينما جزيئة الADN عند الكائن المجهول فتتكون من سلسلة واحدة (الكائن المجهول هو فيروس).

3-1- المنحنى 1: قنفذ البحر

المنحنى 2: الدجاج

المنحنى 3: E.coli

2- التحليل:

تزداد درجة الحرارة اللازمة للفصل بازدياد نسبة القواعد الآزوتية $C + G$ ، حيث أن نسبة $C+G$ عند قنفذ البحر أقل من نسبة $C+G$ عند الدجاج لذلك نجد أن درجة الحرارة اللازمة لفصل جزيئة الADN عند قنفذ البحر أقل من درجة الحرارة اللازمة لفصل جزيئة الADN عند الدجاج.

لكن نجد أن درجة الحرارة اللازمة لفصل جزيئة الADN عند البكتيريا E.coli مرتفعة جدا لأن نسبة $C+G$ كبيرة تفوق نسبة $C+G$ عند الدجاج و عند قنفذ البحر.

3- نعم هذه النتائج تتوافق مع الاقتراح حيث كلما زاد عدد G و C زادت صلابة جزيئة الADN بزيادة عدد الروابط الهيدروجينية حيث يرتبط G مع C بثلاث روابط هيدروجينية.

التمرين الثالث:

أولاً: 1- التفسير:

تجربة 1: موت الفأر و تواجد المكورات (S) حية راجع إلى أن المكورات من النمط (S) مميتة (قاتلة) تملك محافظ منعت الخلايا المناعية من القضاء عليها.

تجربة 2: عدم موت الفأر و عدم وجود مكورات في دمه راجع إلى أن المكورات من النمط (R) غير مميتة ليس لها محافظ و بالتالي تخلصت منها الخلايا المناعية مما سمح ببقاء الفأر حيا.

تجربة 3: عدم موت الفأر و عدم وجود المكورات في دمه بعد حقنه بالمكورات (S) المقتولة بالحرارة راجع إلى أن الحرارة أفقدت (S) محافظها (فقدت قدرتها على القتل) و بالتالي تخلصت الخلايا المناعية من هذه المكورات.

2- نستنتج أن هناك مادة انتقلت من (S) المقتولة بالحرارة إلى (R) فحولتها إلى مكورات من نمط (S) المميت أي أصبحت تملك محفظة.

ثانياً:

3- نستنتج أن ADN هو المسؤول عن تحويل (R) إلى (S) و ليس البروتين و لا الARN.



حي قعلول - برج البحري - الجزائر

4- إذن نفسر نتائج التجربة (4) أن الـADN انتقل من الخلايا (S) المقتولة بالحرارة إلى الخلايا (R) مما أكسبها القدرة على إنتاج محفظة و بالتالي تحولت (R) إلى (S) مميتة.

ثالثا:

أ- تفسير النتائج:

تجربة 1: عدم وجود البكتيريا في الوسط راجع إلى تواجد الستربتوميسين مما أدى إلى موت البكتيريا (ح) الحساسة لهذا المضاد الحيوي و بالتالي ماتت في وجوده.

تجربة 2: تكاثر البكتيريا في الوسط الذي يحتوي على المضاد الحيوي ستربتوميسين راجع إلى أن البكتيريا (م) لها القدرة على مقاومة هذا المضاد الحيوي لذلك تمكنت من العيش في هذا الوسط.

تجربة 3: تكاثر البكتيريا (ح) في الوسط الذي يحتوي على الستربتوميسين في تواجد رشاحة البكتيريا المقاومة راجع إلى أن البكتيريا اكتسبت القدرة على مقاومة الستربتوميسين من الرشاحة (م).

تجربة 4: تكاثر البكتيريا (ح) في الوسط الذي يحتوي على المضاد الحيوي في وجود رشاحة (م) المعالجة بانزيم محلل للبروتينات راجع إلى أن الجزيء المسؤول عن تحول البكتيريا من نمط (ح) إلى نمط (م) ليس من طبيعة بروتينية.

تجربة 5: عدم تكاثر البكتيريا (ح) في الوسط الذي يحتوي على المضاد الحيوي رغم تواجد رشاحة (م) لكنها معالجة بانزيم محلل للـADN راجع إلى أن (ح) لم تتحول إلى (م) لأن المادة المسؤولة عن هذا التحول هي جزيئة الـADN .
ب- المعلومات المستخلصة:

- جزيئة الـADN هي الجزيئة الحاملة للمعلومة الوراثية .
- إن التحول البكتيريا (ح) إلى (م) راجع إلى اندماج الـADN البكتيريا (م) في الـADN البكتيريا (ح).
- و منه نقول أن الجزيئة الـADN هي الحاملة للمعلومة الوراثية.

ج- نعم نستطيع،

التجربة	النتائج
حقن (ح) بروتين من نمط (م) في وسط يحتوي على ستربتوميسين	موت البكتيريا
حقن (ح) ب ARN من نمط (م) في وسط به ستربتوميسين	موت البكتيريا
حقن (ح) ب الـADN من نمط (م) في وسط به ستربتوميسين	بقاء البكتيريا حية



حي قعلول - برج البحري - الجزائر

Web site : www.ets-salim.com / 021.87.16.89 : الفاكس : Tel-Fax : 021.87.10.51