





الدالة الأسية

الكفاءات المستهدفة



الكفاءات المستهدفة من خلال هذا المحور هي :

تعريف الدالة الأسية

مشتقة الدالة الأسية

الدوال الأسية من الشكل $x \mapsto e^{kx}$

3 نفرض أنه توجد دالة ثانية g تحقق $g' = g$ و $g(0) = 0$ ، بمأن f لا تنعدم على $\mathbb{R}$ ، نعتبر الدالة k المعطاة على $\mathbb{R}$

$$k(x) = \frac{g(x)}{f(x)} \quad \text{ب:}$$

• تبين أن الدالة k ثابتة على $\mathbb{R}$

k قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة k' حيث

$$k(x) = \frac{g'(x)f(x) - f'(x)g(x)}{[f(x)]^2} = \frac{g(x)f(x) - f(x)g(x)}{[f(x)]^2} = 0$$

ومنه k ثابتة على $\mathbb{R}$

• الإستنتاج أن: $f(x) = g(x)$

$$k \text{ ثابتة على } \mathbb{R} \text{ ولدينا: } 1 = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1 \text{ ومنه } k(0) = 1 \text{ ومنه } \frac{g(x)}{f(x)} = 1 \text{ ومنه } g(x) = f(x)$$

نستنتج أن الدالة f دالة وحيدة .

4 ليكن y عدد حقيقي كفي ثاب ، نعتبر الدالة i المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $i(x) = \frac{f(x+y)}{f(y)}$

• تبين أن: i دالة ثابتة على $\mathbb{R}$

الدالة i قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة i' حيث

$$i'(x) = \frac{f'(x+y)f(x) - f'(x)f(x+y)}{[f(x)]^2} = \frac{f(x+y)f(x) - f(x)f(x+y)}{[f(x)]^2} = 0$$

• إثبات أن $i(x) = f(y)$

$$\text{لدينا } i(x) = f(y) \text{ ومنه } i(x) = i(0) = \frac{f(y)}{f(0)} = f(y)$$

• إثبات أن: $f(x+y) = f(x)f(y)$

$$\text{لدينا: } i(x) = \frac{f(x+y)}{f(x)} \text{ و } i(x) = f(y) \text{ ومنه } f(x+y) = f(x)f(y)$$

• إثبات أن: $f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$

$$\text{لدينا: } f(x-y) = f(x + (-y)) = f(x)f(-y)$$

$$\text{بمأن } f(y)f(-y) = 1 \text{ فإن } f(-y) = \frac{1}{f(y)} \text{ ومنه } f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$$

5 ليكن n عددا صحيحا نسبيا و لتكن j الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $j(x) = \frac{f(nx)}{[f(x)]^2}$

• إثبات أن j دالة ثابتة

الدالة j قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة j' حيث :

$$\begin{aligned} j'(x) &= \frac{(f(nx))' \times [f(x)]^n - ([f(x)]^n)' \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\ &= \frac{nf'(nx) \times [f(x)]^n - nf'(x) [f(x)]^{n-1} \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\ &= \frac{nf'(nx) \times [f(x)]^n - nf(x) [f(x)]^{n-1} \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\ &= \frac{n[f(x)]^n (f'(nx) - f(nx))}{[f(x)]^{2n}} \\ &= \frac{n(f'(nx) - f(nx))}{[f(x)]^n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

إذن الدالة j دالة ثابتة على $\mathbb{R}$

• إستنتاج أن من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(nx) = [f(x)]^n$

$$\text{من أجل كل عدد حقيقي } x: 1 = \frac{f(0)}{[f(0)]^n} = j(0) = j(x)$$

$$\text{لدينا من أجل كل عدد حقيقي } x: j(x) = 1 \text{ أي } \frac{f(nx)}{[f(x)]^n} = 1 \text{ ومنه } f(nx) = [f(x)]^n$$

تسمى الدالة الوحيدة f القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث: $f(0) = 1$ ، $f' = f$ الدالة الأسية النيبيرية و نرمز لها بالرمز EXP

1 الدالة الأسية

مبرهنة وتعريف

توجد دالة وحيدة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $f' = f$ و $f(0) = 1$ نرسم إلى هذه الدالة بالرمز "exp" ونسميها الدالة الأسية النيبيرية
من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \exp(x)$ وتقرأ أسية x

ملحوظة: الدالة الأسية هي حل خاص للمعادلة التفاضلية $y' = y$ التي تحقق $y(0) = 1$
1 خواص الدالة الأسية

خاصية: الدالة الأسية قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة $\exp'(x) = \exp(x)$

خاصية: الدالة الأسية مستمرة على $\mathbb{R}$ و $\exp(0) = 1$

خاصية: الدالة الأسية موجبة تماما على $\mathbb{R}$ أي من أجل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $\exp(x) > 0$

البرهان

نستعمل مبرهنة القيم المتوسطة على المجال $[0; c]$
من أجل كل عدد حقيقي x (*) $\exp(x) \neq 0$
الدالة $\exp$ مستمرة على $\mathbb{R}$
بفرض وجود عدد حقيقي c حيث $\exp(0) \cdot \exp(c) < 0$ يعني $\exp(x) = 0$ تناقض
خواص جبرية

$$\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y) \text{ ③ } \quad \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \text{ ② } \quad \exp(x) \neq 0 \text{ ①}$$

$$\exp(nx) = [\exp(x)]^n \text{ ⑤ } \quad \exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)} \text{ ④ }$$

2 العدد e والترميز e^x

العدد e هو صورة العدد 1 بالدالة الأسية أي $e = \exp(1)$. تعطينا الحاسبة $e \approx 2.718281828$.
من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\exp(n) = \exp(n \times 1) = [\exp(1)]^n$ ،
لدينا إذن: من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\exp(n) = e^n$.
اصطلاحا نرسم، من أجل كل عدد حقيقي x ، إلى $\exp(x)$ بـ e^x .

كتابة الخواص السابقة بإستعمال الترميز الجديد

$$e^{x+y} = e^x \times e^y \text{ ③ } \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x} \text{ ② } \quad e^x \neq 0 \text{ ①}$$

$$(e^x)' = e^x \text{ ⑦ } \quad e^0 = 1 \text{ ⑥ } \quad e^{nx} = (e^x)^n \text{ ⑤ } \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \text{ ④ }$$

مثال

بسط العبارات التالية : $a = (e^x)^3 \times e^{-5x} \times e^{2x}$ $b = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x} \times e^2}$ $c = \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x}}$

$$c = \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x}} = \frac{e^{2x}}{e^{2x}} + \frac{e^x}{e^{2x}} = 1 + e^{-x}$$

$$b = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x} \times e^2} = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x+2}} = e^{2x+3} \times e^{-(2x+2)} = e^{2x+3-2x-2} = e$$

$$a = (e^x)^3 \times e^{-5x} \times e^{2x} = e^{3x} \times e^{-5x} \times e^{2x} = e^{3x-5x+2x} = e^0 = 1$$

تطبيق

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإن: $f(-x) = 1 - f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا

$$f(-x) = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{\frac{1}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}} = \frac{\frac{1}{e^x}}{\frac{e^x+1}{e^x}} = \frac{1}{e^x+1}$$

$$1 - f(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^x - e^x + 1}{e^x + 1} = \frac{1}{e^x + 1}$$

إذن $f(-x) = 1 - f(x)$

نتيجة: نستنتج أن النقطة $A(0; \frac{1}{2})$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)

تمرين محلول

: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

① بين أن الدالة f فردية.

② بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(2x) = \frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2}$

الحل

① من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $(-x)$ ينتمي إلى $\mathbb{R}$ ولدينا:

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1} = \frac{\frac{1-e^x}{e^x}}{\frac{1+e^x}{e^x}} = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

②

$$\begin{aligned} \frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2} &= \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{1+\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2} = \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{\frac{(e^x+1)^2+(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}} \\ &= \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{\frac{2(e^{2x}+1)}{(e^x+1)^2}} = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right) \frac{(e^x+1)^2}{(e^{2x}+1)} \end{aligned}$$

$$\frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2} = \frac{(e^x-1)(e^x+1)}{(e^{2x}+1)} = \frac{(e^{2x}-1)}{(e^{2x}+1)} = f(2x) \text{ ومنه}$$

وهكذا نجد أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(2x) = \frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2}$

تمرين منزلي — { 2 - 3 } — بي نصف { 102 } حجة

ملاحظات حول سير الدرس

.....
.....
.....

ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية
« ميدان التعلم: التحليل
« موضوع الدرس: دراسة الدالة الأسية

« الأستاذ: بخدة أمين
« المستوى: السنة الثالثة رياضيات
« المدة: 2 ساعة

« المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقريب أولر
« الكفاءات المستهدفة: التعرف على الدالة الأسية النيبيرية وخواصها.
« المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
10 د	التهيئة النفسية تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسية 1 دراسة الدالة الأسية اتجاه تغيير الدالة الأسية : خاصية 1 « من أجل كل عدد حقيقي x ، $e^x > 0$ البرهان « من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $e^x = e^{2 \times \frac{x}{2}} = (e^{\frac{x}{2}})^2$	مرحلة الإنطلاق
10 د	خاصية 2 « الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ البرهان « من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $exp'(x) = e^x > 0$ ومنه e^x متزايدة تماما على $\mathbb{R}$	مرحلة البناء
10 د	نتائج من أجل كل عددين حقيقيين a و b لدينا : • $e^a > e^b$ يعني أن $a > b$ • $e^a = e^b$ يعني أن $a = b$ حالة خاصة من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : • $e^x > 1$ يعني $e^x > e^0$ يعني $x > 0$ • $e^x < 1$ يعني $e^x < e^0$ يعني $x < 0$ • $e^x = 1$ يعني $e^x = e^0$ يعني $x = 0$	مرحلة التقييم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

أضف إلى
معلوماتك



د 10

البرهان

1. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = e^x - x$
لدينا من أجل x من $[0; +\infty[$: $f'(x) = e^x - 1$ وبما أن: من أجل x من $[0; +\infty[$: $e^x \geq 1$ فإن: $f'(x) \geq 0$
ومنه f متزايدة تماماً على $[0; +\infty[$ و $f(0) = 1$
إذن من أجل كل x من $[0; +\infty[$: $f(x) > 0$ أي $e^x > x$
لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
2. من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $e^x = \frac{1}{e^{-x}}$
نضع $y = -x$ إذن لما x يؤول إلى $-\infty$ فإن y يؤول إلى $+\infty$
ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} = 0$

جدول التغيرات

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$exp'(x)$		+	
$exp(x)$	0	1	$+\infty$

التمثيل البياني

- المنحنى (C) الممثل للدالة الأسية يقبل حامل محور الفواصل كاستقيم مقارب لما x يؤول إلى $-\infty$
- لدينا $exp'(0) = exp(0) = 1$ إذن المنحنى (C) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة 0 مماساً $y = x + 1$ معادلة له
- من تعريف العدد المشتق لدينا $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{0+x} - e^0}{x} = exp'(0) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{إذن: } exp'(0) = 1$$

نتيجة

الدالة $x \mapsto x + 1$ هي أحسن تقريب تألفي للدالة $x \mapsto e^x$
بحوار 0.
أي من أجل كل x قريب من 0 لدينا: $e^x \approx x + 1$

تطبيق

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{4e^x + 3}{2(e^x + 1)}$ و (C_f) المنحنى الممثل لها في المستوي إلى معلم متعامد و متجانس $\vec{i}, \vec{j}$ حيث: $\|\vec{i}\| = 2cm$ ($O; \vec{i}, \vec{j}$)

1. أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ، ثم فسر النتيجة هندسياً.

2. أحسب $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$.

3. أدرس إتجاه تغير الدالة f .

4. أرسم المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f) .




د 5



د 15



د 25



طريقة

المعادلة $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ تعني $u(x) = v(x)$
 المتراجحة $e^{u(x)} < e^{v(x)}$ تعني $u(x) < v(x)$

ملاحظة

مجموعة تعريف المعادلة أو المتراجحة هي : $D_v \cap D_u$

التقويم

تطبيق

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات و المتراجحات التالية :

$$e^{x+1} > e^{-\frac{2}{x}} \text{ ⑥} \quad e^{3x} < 1 \text{ ⑤} \quad e^{x+3} = e^{\frac{4}{x}} \text{ ④} \quad e^{-x^2} = \frac{1}{e} \text{ ③} \quad e^x = e^{-2x} \text{ ②} \quad e^{2x} = 1 \text{ ①}$$

$$e^{7x} + 5 = 0 \text{ ⑨} \quad e^{2x} > 2 - e^x \text{ ⑧} \quad e^{2x} > 2e^x - 1 \text{ ⑦}$$

تمرين منزلي

ليكن (C) منحنى ممثل لدالة $x \mapsto e^x$ في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ولتكن $M(m, e^m)$ نقطة من (C) ، وليكن T مماس للمنحنى (C) في النقطة M

1 أحسب ميل المماس في النقطة M ، ثم أكتب معادلته

2 لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = e^x - e^m(x - m + 1)$

• أدرس تغيرات الدالة g و شكل جدول تغيراتها

3 إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} : g(x) > 0$

4 إستنتج الوضع النسبي بين (C) و جميع ممساته.

ملاحظات حول سير الدرس

.....

.....

.....


ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية
« ميدان التعلم: التحليل
« موضوع الدرس: الدوال الأسية : $x \mapsto e^{kx}$

« الأستاذ: بخدة أمين
« المستوى: السنة الثالثة رياضيات
« المدة: 1 ساعة

« المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقريب أولر
« الكفاءات المستهدفة: التعرف على الدالة الأسية النيبيرية وخواصها.
« المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
15 د	التهيئة النفسية تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسية 1 حصة : $f' = kf$ مبرهنة وتعريف توجد دالة وحيدة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث : $f' = kf$ و $f(0) = 1$ هي الدالة $x \mapsto e^{kx}$ البرهان الوجود لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{kx}$ الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = ke^{kx} = kf(x)$ كما أن $f(0) = e^0 = 1$ وبالتالي الدالة f تحقق $f' = kf$ و $f(0) = 1$ الوحدانية نفرض وجود دالة ثانية g قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $g' = kg$ و $g(0) = 1$، نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$، الدالة h قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h'(x) = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{[f(x)]^2} = \frac{kg(x)f(x) - g(x)kf(x)}{[f(x)]^2} = 0$ مع $h(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = 1$ ، ومنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $h(x) = 1$ وعليه $f(x) = g(x)$ إذن الدالة f موجودة ووحدية. مثال 1 عيّن كل الدوال القابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث : $f'(x) - 2f(x) = 0$. 2 من بين الدوال f $f'(x) - 2f(x) = 0$ عيّن تلك منحناها البياني يمر من النقطة $A\left(\frac{1}{2}; e^2\right)$ الحل 1 $f'(x) - 2f(x) = 0$ تعني $f'(x) = 2f(x)$ ومنه $f = kf$ مع $k = 2$. الدوال f هي إذن الدوال المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي: $f(x) = Ce^{2x}$ حيث C عدد حقيقي ثابت .	مرحلة الإنطلاق مرحلة البناء المرحلة



التمثيلات المقابلة هي لدوال f المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي يلي $f(x) = Ce^{2x}$

2 نبحث إذن عن الدالة f حيث $f(x) = Ce^{2x}$ مع $f\left(\frac{1}{2}\right) = e$

ومنه $Ce^{2\left(\frac{1}{2}\right)} = e^2$ أي $C = e$ ومنه $Ce^{2x} = e^{2x+1}$

إذن الدالة الوحيدة f حيث $f'(x) - 2f(x) = 0$ و التي منحناها

البياني يمر من النقطة $A\left(\frac{1}{2}; e^2\right)$ هي الدالة $x \mapsto e^{2x+1}$



د5

أضف إلى
معلوماتك

مبرهنة 2

الدوال غير المعدومة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث : من أجل كل عددين حقيقيين x و y
 $f(x+y) = f(x)f(y)$ هي الدوال $x \mapsto e^{kx}$ حيث k عدد حقيقي

تطبيق

التقويم

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ وغير معدومة حيث من أجل كل عددين حقيقيين x ، y لدينا : $f(x) \times f(y) = f(x+y)$

1 بين أن : $f(0) = 1$.

2 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) \times f(-x) = 1$.

3 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f\left(\frac{x}{2}\right) \times f\left(\frac{x}{2}\right) = f(x)$.

4 إستنتج إشارة $f(x)$

تطبيق

تمرين رقم 12 صفحة 112

تمرين رقم 13 صفحة 112

تمرين منز {11 - 15} — ي صف {102} حة

ملاحظات حول سير الدرس



.....

.....

.....

ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية
« ميدان التعلم: التحليل
« موضوع الحصة: دراسة دالة: $x \mapsto e^{u(x)}$

« الأستاذ: بخدة أمين
« المستوى: السنة الثالثة رياضيات
« المدة: 2 ساعة

« المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقريب أولر
« الكفاءات المستهدفة: دراسة إتجاه تغير الدالة $x \mapsto \exp \circ u(x)$
« المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
المرحلة الأولى	التهيئة النفسية تذكير بمشتقة دالة مركب مجموعة تعريف الدالة $\exp \circ u$: مبرهنة 1 أضف إلى معلوماتك نضع: $f(x) = e^{u(x)}$ حيث u دالة عددية مجموعة تعريف الدالة f هي نفسها مجموعة تعريف الدالة u، إذن: $D_f = D_u$ إتجاه تغير الدالة $\exp \circ u$: مبرهنة 2 أضف إلى معلوماتك إذا كانت u دالة معرفة على المجال I من $\mathbb{R}$ فإن للدالتين u و $\exp \circ u$ نفس إتجاه التغير على I البرهان نعلم أن الدالة $\exp$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$، إذن حسب المبرهنة الخاصة بإتجاه تغير دالة مركبة يكون للدالتين u و $\exp \circ u$ نفس إتجاه التغيرات على المجال D_u مثال نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x$ نلاحظ أن: $f = \exp \circ u$ حيث u هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $u(x) = x^2 - 1$ بما أن الدالة u متناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0]$ فإن: الدالة f متناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0]$ بما أن الدالة u متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ فإن: الدالة f متناقصة تماما على المجال $[0; +\infty[$ النهايات مبرهنة 3 أضف إلى معلوماتك a, b, c تمثل أعدادا حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$ نعتبر الدوال التالية u، e^x و f حيث $f = \exp \circ u$ إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ و $\lim_{x \rightarrow b} e^x = c$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$	مرحلة الإنطلاق مرحلة بناء المعرفة

مثال

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x+2}$
 لدينا: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x+2) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x+2} = +\infty$
 أي $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
 لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x+2) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x+2} = 0$ أي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

المشتقة

مبرهنة 3

أضف إلى

معلوماتك

إذا كانت u دالة قابلة للإشتقاق على مجال I فإن للدالة $exp \circ u$ قابلة للإشتقاق على I
 ولدينا من أجل كل x من I ، $(exp \circ u)'(x) = u'(x)e^{u(x)}$

البرهان

إذا كانت الدالة u قابلة للإشتقاق على I وعلما أن الدالة exp قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ فإن: الدالة المركبة $exp \circ u$ قابلة للإشتقاق على I وبتطبيق قاعدة حساب مشتقة دالة مركبة يكون لدينا من أجل كل x من I
 $(exp \circ u)'(x) = u'(x)exp'(x)[u(x)] = u'(x)exp(x)[u(x)]$

مثال

مشتقة الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x^2+3x-5}$ هي: $f'(x) = (-2x+3)e^{-x^2+3x-5}$
 مشتقة الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}^+$ بـ: $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ هي: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}$

تطبيق

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{x^3+3x+1}$

1 أدرس تغيرات الدالة f

2 أثبت أن المعادلة $f(x) = 2$ تقبل حلا وحيدا على المجال $[-1;0]$

بكالوريا 2013 شعبة علوم تجريبية

I الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $f(x) = \frac{x}{x-1} + e^{\frac{1}{x-1}}$ و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ ، ثم استنتج المستقيمين المقاربين للمنحنى (C) .

2 أحسب $f'(x)$. بين أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;1[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3 بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في $]-\infty;1[$ حلا وحيدا α .

باستعمال جدول القيم أعلاه جد حصرا للعدد α .

4. أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C) ، ثم أرسم المنحنى (C') الممثل للدالة $|f|$.

5. عين بيانيا مجموعة قيم الأعداد الحقيقية m التي من أجلها يكون للمعادلة $|f(x)| = m$ حلان مختلفان في الإشارة.


II الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $g(x) = f(2x-1)$. (عبارة $g(x)$ غير مطلوبة)

x	$f(x)$
0,20	0,037
0,21	0,016
0,22	-0,005
0,23	-0,026
0,24	-0,048
0,25	-0,070

1 أدرس تغيرات الدالة g على $]-\infty; 1]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

- أ) تحقق أنّ $g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = 0$ ، ثم بين أنّ : $g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = 2f'(\alpha)$.
 ب) إستنتج معادلة (T) المماس لمنحنى الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha+1}{2}$.
 ج) تحقق من أنّ : $y = \frac{2}{(\alpha-1)^3}x - \frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$ ، معادلة للمستقيم (T) .

بكالوريا 2019 شعبة تقني رياضي



$g(x) = (x+3)e^x + 1$ كإيلي $\mathbb{R}$ المعرفة على I و (C_g) تمثيلها البياني كما هو مبين في الشكل .
 بقراءة بيانية:

1 حدّد إشارة $g(-1)$ و $g(-\frac{1}{2})$.

2 إستنتج وجود عدد حقيقي α وحيد من المجال $]-1; -\frac{1}{2}]$ بحيث $g(\alpha) = 0$ ثم تحقّق أنّ : $-0.8 < \alpha < -0.7$.

3 إستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

f (II) الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (x+2)(e^x - 1)$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2 بين أنّه من كلّ عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$ ثم كلّ جدول تغيرات الدالة f .

3 أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x)$ ثم إستنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له .

ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

ج) أكتب معادلة (T) مماس (C_f) الموازي للمستقيم (Δ) .

4 أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]-\infty; 1]$ (يعطى $f(\alpha) \approx -0.7$)

5 أحسب $f(x) - g(x)$ ثم إستنتج دالة الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

6 h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي : $h(x) = |x|(e^{|x|} - 2) + 1$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ) بين أنّ الدالة h زوجية .

ب) تأكد أنّه من أجل كل x من المجال $[0; +\infty[$ فإنّ : $h(x) = f(x-2) + 1$.

ج) إشرح كيف يمكن رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم أرسم (C_h) على المجال $[-3; 3]$.

I f_k الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx}$ حيث K وسيط حقيقي .
ليكن (C_k) التمثيل البياني للدالة f_k في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1 بين أن كل المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعيينهما .
- 2 أحسب نهايتي الدالة f_k عند $-\infty$ و $+\infty$. (ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي K) .
- 3 أ) أحسب $f'_k(x)$ ، ثم حدّد حسب قيم الوسيط الحقيقي K اتجاه تغير الدالة f_k .
ب) شكّل جدول تغيرات الدالة f_k من أجل K عدد حقيقي موجب تماما .
- 4 ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي K الأوضاع النسبية للمنحنيين (C_k) و (C_{k+1}) .

II f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$
نسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1 شكل جدول تغيرات الدالة f ، ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right]$.
- 2 أ) بين أن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$ أحدهما α حيث : $-1,27 < \alpha < 1,28$.
ب) عيّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة : $\left|\frac{x+1}{e^x}\right| = \left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ حلا وحيدا .
- 3 g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+1)e^{-2x}$
أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$ ثم إستنتج دالة أصلية لـ g على $\mathbb{R}$.
ب) بإستعمال المكاملة بالتجزئة ، أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = -1$ و $x = 0$

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. تؤخذ وحدة الطول $2cm$
 (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كإيلي : $g(x) = e^x - ex$ و $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2$

- 1 أ) أدرس اتجاه تغير الدالة g .
ب) إستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x الحقيقية .
- 2 أدرس اتجاه تغير الدالة f .
- 3 أحسب كلاً من $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .
- 4 أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.
- 5 أرسم على المجال $[0;2]$ المنحنيين (C_f) و (C_g) في نفس المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (يعطى $e^2 - 2e \approx 2$)
- 6 أحسب بالسنتيمتر المربع ، مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) .
- 7 h الدالة المعرفة على المجال $[-2;2]$ كإيلي : $h(x) = \frac{1}{2}ex^2 - e^{|x|}$ وليكن (Γ) تمثيلها البياني في المعلم السابق
أ) بين أن h دالة زوجية .
ب) من أجل $x \in [0;2]$ أحسب $h(x) + f(x)$ ثم إستنتج كيفية رسم (Γ) إنطلاقاً من (C_f) ثم أرسمه .